# HK-2xZFN-Smc4-mEGFP

301576

## GENERAL INFORMATION

### Description

HK-2xZFN-Smc4-mEGFP □□□□□ HeLa Kyoto □□□□□□□□□□□□□ZFN□□□□□□□□□□□□□□□□ Smc4 □□□Smc4 □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

## HANDLING AND CULTURE

### Culture medium

DMEM□□ 4.5 g/L □□□□4 mM L-□□□□□3.7 g/L $NaHCO_3$ □ 1.0 mM □□□□□Cytion □□□□ 820300a□

| | |
|---|---|
| **Incubation atmosphere** | 37°C□5% $CO_2$□□□□□□ |

### Supplements

□□□□□□□ 10% □□□□□□FBS□

| | |
|---|---|
| **Dissociation reagent** | Accutase |

### Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PBS□□□□□T25□□□□□3-5□□PBS□T75□□□□□□5-10□□□ □□□□ Accutase □□□□□□□T25 □□□□□ 1–2 □□□T75 □□□□□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□ 8–10 □□□□□□□□ □□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 300xg □□ 3 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

## LEGAL AND SAFETY

### Safety precautions

□□□