Daudi

302009

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

Daudin solulinja perustettiin vuonna 1967 16-vuotiaasta afrikkalaisesta pojasta, jolla oli diagnosoitu Burkittin lymfooma. Daudin solulinja on nimetty sen potilaan mukaan, jolta se on peräisin, ja sille on ominaista Epstein-Barr-viruksen (EBV) positiivisuus, joka on yleinen piirre Burkittin lymfoomassa ja useissa muissa lymfoproliferatiivisissa sairauksissa. EBV-infektio näissä soluissa tarjoaa ainutlaatuisen mallin, jonka avulla voidaan tutkia viruksen roolia kasvainten synnyssä, erityisesti B-solujen pahanlaatuisten sairauksien yhteydessä.
Daudin ihmissoluissa ei ilmene klassisia MHC-luokan I molekyylejä niiden pinnalla, mikä johtuu siitä, että niiden pinnalla ei esiinny beeta-2-mikroglobuliinia, joka on ratkaisevan tärkeä komponentti, joka vastaa MHC-luokan I molekyylin oikeasta solunsisäisestä taittumisesta ja prosessoinnista endoplasmisessa retikulumissa. Beeta-2-mikroglobuliinin puute Daudin solulinjassa johtaa näiden molekyylien asianmukaisen solupinnan ilmentymisen edellyttämien glykosyylimodifikaatioiden puuttumiseen.
Daudin solulinjaa käytetään laajalti immunologisessa tutkimuksessa, erityisesti tutkimuksissa, joihin liittyy lymfosyyttien osapopulaatioiden, kuten lymfosyyttien, luonnollisten tappajasolujen ja perifeerisen veren mononukleaaristen solujen, immunodepletio.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Daudin solulinja on tärkeä resurssi, joka edistää tietämystämme eri tutkimusaloilla solubiologian perusymmärryksestä syövän hoitoon tarkoitettujen kohdennettujen hoitojen kehittämiseen.

Kudos	Veri
Sairaus	Burkittin lymfooma

Sovellukset

B-solujen pinta-antigeenien analysointi, sytotoksisten lääkkeiden testaus, mutaatioanalyysi, apoptoottisten mekanismien analysointi, määritysten kehittäminen.

Synonyymit

- DAUDI
- NK-10A
- NK-10a
- NK 10a
- NK10a
- N
- GM03190
- GM3190
- GM03190A
- GM17346

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Mies
Kasvuominaisuudet	Jousitus

OMINAISUUDET

Morfologia	Pyöreät kennot
Solutyyppi	B-lymfoblasti

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Karyotyyppi

46, lähes diploidi

TUNNISTEET

Lähdeviite

Daudi (Cytionin luettelonumero 302009)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_0008

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Antigeenin ilmentyminen

CD10+, CD19+, CD20+, CD21+, CD22+, CD23-, CD24-, CD32+, CD37+, CD38+, CD39-, CD40+, CD54+, CD72+, CD73-, CD75+, CD77+, CD81+, CD82+, CD83-, CD84+, CD86+

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO_2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 % lämpöinaktivoidulla FBS:llä

Soluviljely

Ylläpidä viljelmiä lisäämällä tai vaihtamalla kasvualusta säännöllisesti. Aloita viljelyt tiheydellä 5 x 10^5 solua/ml ja pidä solupitoisuus välillä 3 x 10^5 – 1 x 10^6 solua/ml optimaalisen kasvun saavuttamiseksi.

Kylvötiheys	3 x 10^5 solua/ml
Nesteen uusiminen	2 kertaa viikossa
Sulamisen jälkeinen palautuminen	Nopea (48 tuntia)

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	16 vuotta
Etnisyys	Afrikkalainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes