WIL2

302011

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

Wil2 è una linea cellulare linfoblastoide B umana derivata dai linfociti B del sangue periferico di un donatore adulto e successivamente immortalizzata tramite trasformazione con il virus di Epstein-Barr (EBV). In quanto linea cellulare in sospensione EBV-positiva, Wil2 presenta le caratteristiche tipiche delle cellule B attivate, tra cui la proliferazione continua, l'espressione dei marcatori di superficie delle cellule B e la capacità di sintetizzare immunoglobuline. Le cellule crescono in sospensione come cellule singole o piccoli cluster e vengono comunemente mantenute in condizioni standard di coltura dei linfociti integrate con siero.
Dal punto di vista fenotipico, le cellule Wil2 esprimono marcatori tipici del lignaggio B quali CD19, CD20 e immunoglobuline di superficie, insieme a marcatori associati all'attivazione indotti dall'espressione genica latente dell'EBV. La presenza di episomi dell'EBV stimola la proliferazione e favorisce la coltura a lungo termine, rendendo questa linea cellulare un modello utile per lo studio della latenza virale, dell'attivazione delle cellule B e delle interazioni ospite-virus. Inoltre, Wil2 è stata utilizzata nella ricerca immunologica e di biologia molecolare incentrata sulla produzione di anticorpi, sulla presentazione dell'antigene e sulle vie di trasduzione del segnale nei linfociti B trasformati.
Sebbene Wil2 funga da modello rappresentativo di cellule B trasformate dall'EBV, i dati pubblicati disponibili sul suo background genetico dettagliato e sulla sua specializzazione funzionale rimangono relativamente limitati rispetto alle linee linfoblastoidi caratterizzate in modo più approfondito. I ricercatori sono incoraggiati a convalidare specifiche proprietà fenotipiche o funzionali nel loro contesto sperimentale e a consultare banche dati aggiornate o la letteratura primaria per i dati di caratterizzazione più recenti.

Tessuto	Milza
Malattia	Sferocitosi ereditaria

Sinonimi

- WIL-2
- Wil.2
- WI-L2
- Wi-L2

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Maschio
Proprietà di crescita	Sospensione
Livello di biosicurezza	1

CARATTERISTICHE

Tipo di cellula	Linfoblasto B

Cariotipo

46, ipodiploide

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

WIL2 (numero di catalogo Cytion 302011)

Codice fiscale NCBI	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_6544

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO3 (articolo Cytion numero 820700a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS

Subcoltura

Mantenere le colture aggiungendo o sostituendo periodicamente il terreno. Avviare le colture con una densità di 5 x 10^5 cellule/ml e mantenere la concentrazione cellulare compresa tra 3 x 10^5 e 1 x 10^6 cellule/ml per una crescita ottimale.

Densità di semina	1 x 10^5 cellule/mL
Rinnovo dei fluidi	2 volte a settimana
Recupero post-scongelamento	Veloce

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	5 anni
Etnia	Caucasico

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes