WIL2

302011

GENEL BILGILER

Açıklama

Wil2, yetişkin bir donörün periferik kan B lenfositlerinden elde edilen ve daha sonra Epstein–Barr virüsü (EBV) dönüşümü yoluyla ölümsüzleştirilmiş bir insan B lenfoblastoid hücre hattıdır. EBV-pozitif bir süspansiyon hücre hattı olan Wil2, sürekli proliferasyon, B hücresi yüzey belirteçlerinin ekspresyonu ve immünoglobulin sentezi kapasitesi dahil olmak üzere aktive B hücrelerinin karakteristik özelliklerini sergiler. Hücreler, süspansiyon içinde tek hücreler veya küçük kümeler halinde büyür ve genellikle serum ilaveli standart lenfosit kültür koşullarında muhafaza edilir.
Fenotipik olarak, Wil2 hücreleri, EBV latent gen ekspresyonu tarafından indüklenen aktivasyonla ilişkili belirteçlerin yanı sıra CD19, CD20 ve yüzey immünoglobulinleri gibi tipik B-soy belirteçlerini eksprese eder. EBV episomlarının varlığı, proliferasyonu tetikler ve uzun süreli kültürü destekler; bu da bu hücre hattını viral latenstik, B hücresi aktivasyonu ve konak-virüs etkileşimlerini incelemek için yararlı bir model haline getirir. Ayrıca Wil2, transformasyon geçirmiş B lenfositlerinde antikor üretimi, antijen sunumu ve sinyal iletim yolaklarına odaklanan immünolojik ve moleküler biyoloji araştırmalarında kullanılmıştır.
Wil2, temsili bir EBV ile transformasyon geçirmiş B hücresi modeli olarak hizmet etse de, ayrıntılı genetik arka planı ve fonksiyonel uzmanlaşması hakkında mevcut yayınlanmış veriler, daha kapsamlı bir şekilde karakterize edilmiş lenfoblastoid hatlarına kıyasla nispeten sınırlıdır. Araştırmacılar, spesifik fenotipik veya fonksiyonel özellikleri kendi deneysel bağlamlarında doğrulamaya ve en güncel karakterizasyon verileri için güncellenmiş veritabanlarına veya birincil literatüre başvurmaya teşvik edilmektedir.

Doku	Dalak
Hastalık	Kalıtsal sferositoz

Eş anlamlılar

- WIL-2
- Wil.2
- WI-L2
- Wi-L2

SINIFLANDIRMA

Canlı	İnsan
Cinsiyet	Erkek
Büyüme özellikleri	Askıya alma
Biyogüvenlik seviyesi	1

ÖZELLIKLER

Hücre türü	B lenfoblast

Karyotip

46, hipodiploid

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

WIL2 (Cytion katalog numarası 302011)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_6544

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

RPMI 1640, w: 2.0 mM stabil Glutamin, w: 2.0 g/L NaHCO3 (Cytion makale numarası 820700a)

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %10 FBS ile takviye edin

Alt kültür oluşturma

Kültürleri, besiyerini periyodik olarak ekleyerek veya değiştirerek muhafaza edin. Kültürleri 5 x 10^5 hücre/ml yoğunlukta başlatın ve optimal büyüme için hücre konsantrasyonunu 3 x 10^5 ila 1 x 10^6 hücre/ml aralığında tutun.

Ekim yoğunluğu	1 x 10^5 hücre/mL
Sıvı değişimi	haftada 2 kez
Çözülme sonrası toparlanma	Hızlı

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

BAĞIŞÇI

Bağışçının yaşı	5 yıl

Etnik köken	Kafkas

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir	Yes