B-LCL-CDG4

302015

معلومات عامة

الوصف

B-LCL-CDG4 هو سلالة خلايا لمفاوية بائية محوّلة بفيروس إبيفوس مشتقة من فتاة صغيرة مصابة بفقر الدم الليمفاوي CDAII. CDAII هو فقر دم وراثي نادر، ينتمي إلى فئة اضطرابات الغليكوزيل CDG. ويعاني مرضى CDAII من خلل في الجين SEC23B المكون لـ COPII والذي يشارك في نظام نقل البروتين داخل الخلايا (من ER). يكون البروتين السكري للنطاق 3 من أغشية كرات الدم الحمراء تحت الغليكوزيل عن طريق الغليكوزيل الشاذ في البروتينات السكرية في أغشية كرات الدم الحمراء عن طريق الغليكوزيل الشاذة في البروتينات السكرية وليس في الغليكوزيلينوليبيدات السكرية، وبالتالي فإن النطاق 3 من كرات الدم الحمراء يحتوي على سكريات قليلة التهجين من CDA II النوع الهجين المقطوع. يشير هذا إلى وجود خلل إضافي في إنزيمات الغليكوزيل في جولجي مانوسيداز 2 أو ناسيتيل جلوكوزامينيل ترانسفيراز 2 المريض المعني متماثل الزيجوت للطفرة في هذا الجين. خاصةً التبرعم الحويصلي من

الأنسجة	الدم المحيطي
المرض	اضطرابات الجليكوزيل الخلقية

التطبيقات

التنميط الوراثي لتأثيرات البروتينات السمية الخلوية في الخلايا المناعية، والاختبار الوظيفي (مثل مستضدات سطح الخلايا البائية)، واختبار الأدوية السامة للخلايا، والتحليل الطفراتي، وتحليل آليات موت الخلايا المبرمجة، وتحديد نمط مستضدات الخلايا البائية، وتأثير خلل في الغليكوزيلين في البروتينات السكرية الخلوية المتميزة على وظائف متنوعة.

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	أنثى
خصائص النمو	التعليق
مستوى السلامة البيولوجية	2

الخصائص

المورفولوجيا	الخلايا الدائرية
نوع الخلية	الخلايا اللمفاوية ب

المعرّفات

المرجع

B-LCL-CDG4 (كتالوج سيتيون رقم الكتالوج 302015)

رقم التعريف الضريبي لدى NCBI	9606
سيلوصور	CVCL_A9Y2

التعبير والقابلية للإصابة

المستضدات السطحية

CD15 (لويس إكس)+، CD15s (سياليلات لويس إكس)-، CD75s (سياليلات لاكتوزامينيل نوليغوسكشاريدس)+، CD173 (فصيلة الدم H)-، CD174 (فصيلة الدم لويس ذ)-، CD175 (تن)-، CD175s (سياليلات تن)-، CD176 (تن)+

التعبير عن المستضد

CD19+، CD20+، CD37+، CD43+، CD44+، CD45+، CD45R0-، CD45R0، MHC Cl.I+، MHC الفئة الثانية (HLA-DR)+

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

الفيروسات

المتحول: فيروس الورم الحليمي البشري

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

RPMI 1640، ث: 2.0 جم/لتر NaHCO3 (820700 رقم المادة من سايتيون a) ث: 2.0 مللي مولار جلوتامين مستقر،

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

المعطل بالحرارة إلى الوسط FBS إضافة 10% من

إعادة الاستنبات

حافظ على الثقافات عن طريق إضافة أو استبدال الوسط بشكل دوري. ابدأ الثقافات بكثافة 2 × 10^5 خلية/مل وحافظ على تركيز الخلايا في نطاق 3 × 10^5 إلى 5 × 10^5 خلية/مل لتحقيق النمو الأمثل.

تجديد السوائل	بمجرد أن يتحول اللون المتوسط إلى الأصفر
التعافي بعد ذوبان الجليد	متوسط

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ 10% DMSO + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

عمر المتبرع	الطفل
الأصل العرقي	قوقازي

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

نلتزم في Cytion، في Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB