B-LCL-CDG5

302016

INFORMASI UMUM

Deskripsi

B-LCL-CDG5 adalah garis sel limfosit B yang ditransformasi EBV yang berasal dari pasien dengan PMM2-CDG, kelainan glikosilasi (CDG) bawaan yang disebabkan oleh mutasi pada gen *PMM2*. Gangguan ini mengganggu sintesis dan perlekatan struktur glikan yang tepat pada glikoprotein dan glikolipid, yang memengaruhi berbagai sistem organ. Kekurangan fosfomannomutase 2 (PMM2) mengganggu konversi manosa-6-fosfat menjadi manosa-1-fosfat, langkah penting dalam glikosilasi, yang menyebabkan kerusakan pada fungsi seluler dan komplikasi sistemik.
Sebagai garis sel B yang diimobilisasi EBV, B-LCL-CDG5 berfungsi sebagai model penting untuk mempelajari efek biokimia dan molekuler dari mutasi *PMM2*. Garis sel ini memungkinkan para peneliti untuk menyelidiki cacat glikosilasi, aktivitas enzimatik PMM2, dan konsekuensi seluler dari glikosilasi yang terganggu. Selain itu, ini menyediakan platform untuk menguji pendekatan terapeutik potensial, seperti pendamping farmakologis, terapi peningkatan enzim, atau strategi suplementasi substrat. B-LCL-CDG5, dalam kombinasi dengan garis sel yang berasal dari pasien CDG lainnya, membantu dalam memajukan pemahaman kita tentang PMM2-CDG dan pengembangan opsi pengobatan yang ditargetkan.

Tisu	Darah tepi
Penyakit	Baris sel limfoblastoid B yang mengalami transformasi oleh EBV (B-LCL); PMM2-CDG (gangguan glikosilasi bawaan, berasal dari pasien)
Lokasi metastasis	Tidak berlaku (B-LCL yang mengalami transformasi akibat EBV; non-metastatik)

Aplikasi

Genotipe efek CDG pada sel imun, pengujian fungsional (misalnya antigen permukaan sel B), pengujian obat sitotoksik. Analisis mutasi, analisis mekanisme apoptosis, pengetikan HLA, dampak glikosilasi yang rusak dari glikoprotein seluler yang berbeda pada beragam fungsi.

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Perempuan
Sifat-sifat pertumbuhan	Penangguhan
Status GMO	GMO-S2

Rincian status GMO

GMO-S2: This B-LCL contains a stably maintained EBV episome encoding viral latent-phase genes (EBNA-1/-2/-3, LMP-1/-2). EBV is a risk group 2 pathogen; BSL-2 containment required. This classification applies within Germany; regulations may differ elsewhere.

Tingkat keamanan hayati	2

KARAKTERISTIK

Morfologi	Sel bulat
Jenis sel	Limfosit B

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

B-LCL-CDG5 (Nomor katalog Cytion 302016)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	Not assigned

EKSPRESI DAN KERENTANAN

Virus

Transformant: EBV

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

RPMI 1640, w: 2,0 mM Glutamin stabil, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Nomor artikel Cytion 820700a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Lengkapi media dengan 10% FBS yang dinonaktifkan dengan panas

Perbanyakan sel

Pertahankan kultur dengan secara berkala menambahkan atau mengganti medium. Mulailah kultur dengan kepadatan 2 x 10^5 sel/ml dan jaga konsentrasi sel dalam rentang 1 x 10^5 hingga 5 x 10^5 sel/ml untuk pertumbuhan optimal.

Pergantian cairan	Setelah warna medium berubah menjadi kuning
Pemulihan pasca-pencairan	Sedang

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Etnis	Kaukasia

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes