PLH

302137

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apraksts

PLH šūnu līnija ir Epšteina-Barra vīrusa (EBV) transformēta cilvēka limfoblastoīdu šūnu līnija, kas iegūta no pacienta ar iedzimtu virsnieru hiperplāziju (CAH), ko izraisījis steroīdu 21-hidroksilāzes (21-OHāzes) deficīts. Šī autosomāli recesīvā slimība, kas traucē kortizola biosintēzi, ir cieši saistīta ar specifiskiem HLA haplotipiem, īpaši HLA-Bw47;DR7. PLH līnija ir homozigotiska šim haplotipam, un to izmanto kā ģenētisko modeli, lai pētītu 21-OHāzes deficīta molekulāro pamatu. Tā ir īpaši vērtīga, pētot gēnu izdzēšanu, kas ietekmē citohroma P-450C21 gēnu, kurš ir atbildīgs par 21-hidroksilēšanu, kas ir būtisks kortizola ražošanas posms. Molekulārās analīzes, izmantojot DNS zondes, apstiprināja, ka PLH šūnām ir homozigotiska viena no diviem P-450C21 gēniem delecija, kas atbilst 21-hidroksilāzes aktivitātes zudumam, kas novērots skartajiem indivīdiem.
PLH šūnu līnija bija daļa no Ceturtā Āzijas un Okeānijas Histokompatibilitātes semināra (4AOHW) paneļa, kura mērķis bija nodrošināt labi raksturotu ar EBV transformētu limfoblastoīdu šūnu līniju kopumu, kas pārstāv dažādas MHC alēles un haplotipus. Šie paneļi kalpo kā būtiski resursi histokompatibilitātes pētījumiem, HLA tipizācijas izstrādei un imūnģenētikas pētījumiem. PLH atlase iekļaušanai 4AOHW atspoguļo tās unikālo MHC genotipu un nozīmīgumu slimībām, veicinot gan HLA alēļu piešķiršanas standartizāciju, gan pētījumus, kuros tiek pētīta ar imunitāti saistītu traucējumu ģenētiskā struktūra.

Audums	Virsnieru dziedzeris
Slimība	Klasiska iedzimta virsnieru hiperplāzija 21-hidroksilāzes deficīta dēļ
Metastāžu vieta	Perifērās asinis

KLASIFIKĀCIJA

Organisms	Cilvēks
Sekss	Sieviete
Augšanas īpašības	Atsperes

RAKSTURLIELUMI

Morfoloģija	Limfoblasts
Šūnu tips	B šūna

IDENTIFIKATORI

Atsauce

PLH (Cytion kataloga numurs 302137)

NCBI nodokļu identifikācijas numurs	9606
Cellosaurus	CVCL_E810

PAZĪMES UN UZŅĒMĪBA

Vīrusi

Epšteina-Barra vīruss (EBV)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

APSTRĀDE UN AUDZĒŠANA

Barotne

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabils glutamīns, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion izstrādājuma numurs 820700a)

Inkubācijas vide	37°C, 5%CO2, mitrināta atmosfēra.

Papildinājumi

Papildināt barotni ar 10% FBS

Pārstādīšana

Viegli homogenizējiet šūnu suspensiju kolbā, pipetējot uz augšu un uz leju, pēc tam ņemiet reprezentatīvu paraugu, lai noteiktu šūnu blīvumu uz ml. Atšķaidiet suspensiju, lai sasniegtu šūnu koncentrāciju 1 x 10^5 šūnas/ml ar svaigu kultūras barotni, un sadaliet pielāgoto suspensiju jaunās kolbās turpmākai kultivēšanai.

Atkausēšana un kultivēšana

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITĀTES KONTROLE UN KRIOKONSERVĀCIJA

Sterilitāte

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.
Lai pārliecinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.

Saldēšanas barotne	Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanos un samazinātu krioinducēto stresu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpeklī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starpposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Piegādes nosacījumi

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidruma daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

ZIEDOTĀJS

Donora vecums	Nav norādīts
Etniskā piederība	Skandināvu, kaukāziešu

JURIDISKIE JAUTĀJUMI UN DROŠĪBA

Drošības pasākumi

Plānojot uzglabāt kriokviālu šķidrā slāpeklī turpmākai atkausēšanai, obligāti jāievēro stingri drošības pasākumi. Ir nepieciešami piemēroti aizsargcimdi un apģērbs, un, pārvietojot sasaldētos paraugus uz šķidrā slāpekļa tvertni vai no tās, ir jālieto sejas maska vai aizsargbrilles. Tas jādara, lai mazinātu traumu risku, ko var radīt iespējamas kriokrioviālu eksplozijas, kas var izraisīt asu fragmentu izmešanu.

Garantija

Uzņēmumā Cytion mēs atbalstām savu produktu kvalitāti un dzīvotspēju.
Mēs garantējam, ka mūsu šūnas būs dzīvotspējīgas kultivēšanas sākumā 60 dienas pēc nosūtīšanas no mūsu ražotnēm.
Mēs nodrošinām, ka visi materiāli atbilst analīzes sertifikātā un/vai produkta lapā aprakstītajām specifikācijām
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu <a href=""/"/Kas mēs esam/garantija/"" hreflang=""x-default"">Garantijas paziņojumu

Nepieciešams materiālu nodošanas līgums	Yes