PLH

302137

GENERAL INFORMATION

Description

A linhagem celular PLH é uma linhagem de células linfoblastoides humanas transformadas pelo vírus de Epstein-Barr (EBV), derivada de um paciente com hiperplasia adrenal congênita (HAC) devido à deficiência da 21-hidroxilase de esteróides (21-OHase). Essa doença autossômica recessiva, que prejudica a biossíntese do cortisol, está fortemente associada a haplótipos específicos do HLA, particularmente o HLA-Bw47;DR7. A linha PLH é homozigótica para esse haplótipo e tem sido utilizada como modelo genético para investigar a base molecular da deficiência de 21-OHase. Ela é especialmente valiosa no estudo de deleções genéticas que afetam o gene do citocromo P-450C21, responsável pela 21-hidroxilação, uma etapa crucial na produção de cortisol. Análises moleculares utilizando sondas de DNA confirmaram que as células PLH apresentam uma deleção homozigótica de um dos dois genes P-450C21, o que é consistente com a perda da atividade da 21-hidroxilase observada em indivíduos afetados.
A linhagem celular PLH fez parte do painel do Quarto Workshop de Histocompatibilidade da Ásia-Oceania (4AOHW), que teve como objetivo fornecer um conjunto bem caracterizado de linhagens de células linfoblastoides transformadas pelo EBV, representando diversos alelos e haplótipos do MHC. Esses painéis servem como recursos essenciais para estudos de histocompatibilidade, desenvolvimento de tipagem de HLA e pesquisa em imunogenética. A seleção da PLH para inclusão no 4AOHW refletiu seu genótipo MHC único e sua relevância para a doença, contribuindo tanto para a padronização das atribuições de alelos de HLA quanto para estudos que exploram a arquitetura genética de doenças relacionadas ao sistema imunológico.

Tissue	Glândula adrenal
Disease	Hiperplasia adrenal congênita clássica devido à deficiência de 21-hidroxilase
Metastatic site	Sangue periférico

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Suspension

CHARACTERISTICS

Morphology	Linfoblasto
Cell type	Célula B

IDENTIFIERS

Citation

PLH (número de catálogo da Cytion 302137)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_E810

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Viruses

Vírus de Epstein-Barr (EBV)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, com 2,0 mM de glutamina estável e 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artigo da Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione 10% de FBS ao meio

Subculturing

Homogeneíze suavemente a suspensão celular no frasco por meio de pipetagem para cima e para baixo e, em seguida, colete uma amostra representativa para determinar a densidade celular por ml. Dilua a suspensão com meio de cultura fresco até atingir uma concentração celular de 1 x 10^5 células/ml e distribua a suspensão ajustada em alíquotas em novos frascos para continuação do cultivo.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	Não especificado
Ethnicity	escandinavo, caucasiano

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB