COX

302138

GENERAL INFORMATION

Description

הוא משמש לעתים קרובות .(EBV) המופק מתורם אנושי ומומר באמצעות נגיף אפשטיין-בר (B-LCL) לימפוציטואידי-B הוא קו תאים COX קו התאים מייצג COX קו התאים במחקר אימונוגנטיקה והיסטו-תאימות בשל הכללתו בפאנלים של הקבוצה הבינלאומית לעבודה בתחום ההיסטו-תאימות (IHWG). הקשור לרגישות למחלות אוטואימוניות כגון סוכרת מסוג 1, HLA-A1-B8-Cw7-DR3-DQ2, הפלוטיפ ספציפי של קומפלקס היסטו-תאיות עיקרי (MHC), זאבת אדמנתית מערכתית ומיאסטניה גרביס. הפלוטיפ זה בולט ברמת חוסר האיזון הגבוהה שלו, מה שהופך את קו התאים למודל חיוני לחקר הקשרים הגנטיים הקשורים ל-MHC.
אופיין במלואו במסגרת פרויקט COX הרצף הגנומי של ההפלוטיפ MHC Haplotype. 4.8-הוא משתרע על פני כ Mb, וכולל את אזורי MHC מסוג I, II ו-III, וריבוי וריאציות מבניות, המספקים תובנות על (SNP) המורחב. ריצוף מפורט חשף מעל 16,000 פולימורפיזמים של נוקלאוטיד בודד I וכן את אזור סוג הופך אותו למשאב מרכזי להבנת תפקוד מערכת החיסון והבסיס הגנטי של מחלות COX בקו התאים המבנה הגנטי של אזור זה. האפיון המקיף של הקשורות ל-HLA.
וכן למחקרים פונקציונליים על עיבוד והצגת אנטיגנים, .MHC-משמש למיפוי מדויק של לוקוסים הקשורים למחלות בתוך ה COX במחקר, קו התאים ומסייע בזיהוי וריאנטים של סיכון למחלות ויעדים טיפוליים, MHC הפרופיל הגנטי המוגדר היטב שלו מאפשר מחקרים השוואתיים עם הפלוטיפים אחרים של פוטנציאליים. בנוסף, קו התאים מעורב בהערכת טכנולוגיות ריצוף וגנוטיפ חדשות, ומשמש כנקודת ייחוס סטנדרטית במחקרים אימונוגנטיים.

Tissue	דם היקפי
Disease	לימפומה מסוג ברקיט

Synonyms

- LCL (DR3)

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Suspension
Biosafety level	2

CHARACTERISTICS

Morphology	תאים עגולים
Cell type	לימפוציט B

IDENTIFIERS

Citation

COX (מספר קטלוגי Cytion 302138)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_E534

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Viruses

השתנה על ידי EBV

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM גלוטמין יציב, w: 2.0 g/L NaHCO3 (מספר קטלוגי של Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

מנוטרל בחום FBS הוסף לתווך 10%

Subculturing

הומוגניזציה עדינה של תמיסת התאים בבקבוק באמצעות פיפטה למעלה ולמטה, ולאחר מכן לקיחת דגימה מייצגת כדי לקבוע את צפיפות התאים למ"ל. דילול התמיסה כדי להשיג ריכוז תאים של 1×10^5 תאים/מ"ל עם מצע תרבית טרי, וחלוקת התמיסה המותאמת לבקבוקים חדשים להמשך התרבית.

Seeding density	5×10^5 תאים/סמ"ר
Post-thaw recovery	5×10^5 תאים/סמ"ר והניח לתאים להתאושש מתהליך ההקפאה, צלחת את התאים ב-לאחר ההפשרה, ולהידבק למשך 24 שעות לפחות.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו-, (Cytion 800100 מספר קטלוגי) CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך C-שורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78° ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Donor age	גיל לא צוין
Ethnicity	קווקזי

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">הצהרת האחריות שלנו

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB