COX

302138

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

COX-cellelinjen er en referanse B-lymfoblastoid cellelinje (B-LCL) som stammer fra en human donor og er transformert med Epstein-Barr-virus (EBV). Den brukes ofte i immunogenetisk forskning og histokompatibilitetsforskning fordi den er inkludert i International Histocompatibility Working Group (IHWG)-panelene. COX-cellelinjen representerer en spesifikk haplotype i det store histokompatibilitetskomplekset (MHC), HLA-A1-B8-Cw7-DR3-DQ2, som er forbundet med mottakelighet for autoimmune sykdommer som type 1-diabetes, systemisk lupus erythematosus og myasthenia gravis. Denne haplotypen er kjent for sin høye grad av koblingsulikhet, noe som gjør cellelinjen til en viktig modell for å studere MHC-relaterte genetiske assosiasjoner.
Den genomiske sekvensen til COX-haplotypen har blitt fullstendig karakterisert som en del av MHC-haplotypeprosjektet. Den spenner over ca. 4,8 Mb og omfatter klasse I-, II- og III-regionene i MHC, samt den utvidede klasse I-regionen. Detaljert sekvensering avdekket over 16 000 enkeltnukleotidpolymorfismer (SNP-er) og en rekke strukturelle variasjoner, noe som gir innsikt i den genetiske arkitekturen i denne regionen. COX-cellelinjens omfattende MHC-karakterisering gjør den til en nøkkelressurs for å forstå immunsystemets funksjon og det genetiske grunnlaget for HLA-assosierte sykdommer.
I forskning brukes COX-cellelinjen til finkartlegging av sykdomsassosierte loci i MHC, samt til funksjonelle studier av antigenprosessering og -presentasjon. Den veldefinerte genetiske profilen gjør det mulig å sammenligne cellelinjen med andre MHC-haplotyper, noe som bidrar til identifisering av sykdomsrisikovarianter og potensielle terapeutiske mål. I tillegg er cellelinjen involvert i evalueringen av nye sekvenserings- og genotypingsteknologier, og fungerer som en standardreferanse i immunogenetiske studier.

Vev	Perifert blod
Sykdom	Burkitt-lymfom

Synonymer

- LCL (DR3)

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Oppheng
Biosikkerhetsnivå	2

EGENSKAPER

Morfologi	Runde celler
Celletype	B-lymfoblast

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

COX (Cytion katalognummer 302138)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_E534

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Virus

Transformert av EBV

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820700a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % varmeinaktivert FBS

Subkultivering

Homogeniser cellesuspensjonen i kolben forsiktig ved å pipettere opp og ned, og ta deretter en representativ prøve for å bestemme celletettheten per ml. Fortynn suspensjonen til en cellekonsentrasjon på 1 x 10^5 celler/ml med ferskt dyrkningsmedium, og fordel den justerte suspensjonen i nye kolber for videre dyrking.

Såtetthet	5 x 10^5 celler/cm^2
Gjenoppretting etter tining	Etter tining, plasser cellene på 5 x 10^5 celler/cm^2 og la cellene komme seg etter fryseprosessen og feste seg i minst 24 timer.

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	Uspesifisert alder
Etnisitet	Kaukasisk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes