35,1

305002

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

35.1 ovat hybridoomasoluja, jotka on johdettu Mus musculus B-soluista ja myeloomasta. Erityisen kiinnostavaa on niiden reaktiivisuus ihmisen T-solujen pintaproteiinille Tp50 (CD2), mikä tekee niistä arvokkaita välineitä kohdennettuun tutkimukseen. 35.1-solujen tuottama vasta-aine estää T-solujen proliferatiivisia vasteita ja sytotoksisuutta häiritsemättä vasta-aineen välittämää solujen sytotoksisuutta. Pernasolujen ja NSI/1-myeloomasolujen fuusiosta peräisin olevat 35.1-solut ilmentävät immunoglobuliinien, erityisesti ihmisen CD2:ta vastaan tarkoitettujen monoklonaalisten vasta-aineiden tuotantoon tarkoitettuja geenejä. Vasta-aineen isotyyppi on IgG2a.

Kudos	Perna (B-soluperäinen) / Luuydin (NSI/1-myelooman fuusiokumppani)
Sairaus	Hybridoma (B-solu × myelooma-fuusio); tuottaa monoklonaalista vasta-ainetta ihmisen CD2:ta vastaan (Tp50)
Metastaasikohde	Ei sovelleta (hybridomasolulinja; ei primaarinen kasvainnäyte)

Sovellukset

Monoklonaalisten vasta-aineiden tuotanto (ihmisen CD2:ta vastaan, IgG2a); T-solubiologian tutkimus; CD2:n välittämää T-solujen aktivaatiota ja proliferaatiota koskevat tutkimukset; CD2:n salpausta edellyttävät immunologiset määritykset; sytotoksisuustutkimus; hybridoma-tekniikka

Synonyymit

- HB-222

LUOKITTELU

Organismi	Hiiri
Sukupuoli	Määrittelemätön
Kasvuominaisuudet	Jousitus
GMO-status	GMO-S1

GMO-statuksen tiedot

GMO-S1: This hybridoma contains rearranged immunoglobulin genes from a B cell-myeloma fusion. IgG2a heavy and light chain genes are expressed from the B cell fusion partner. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Bioturvallisuustaso	2

OMINAISUUDET

Morfologia	Lymfoblastit
Solutyyppi	B-lymfoblasti- / hybridomasolut
Kaksinkertaistumisaika	noin 24–36 tuntia

TUNNISTEET

Lähdeviite

1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-verotunnus	10090
Cellosaurus	CVCL_7239

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Proteiinin ilmentyminen

Immunoglobuliini, monoklonaalinen vasta-aine, ihmisen CD2:ta vastaan

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Lisää elatusaineeseen 10 % FBS:ää ja 0,05 mM 2-merkaptoetanolia

Dissosiaatioreagenssi	Ei mitään

Soluviljely

Homogenoi solususpensio varovasti pullossa pipetoimalla ylös ja alas, ota sitten edustava näyte solutiheyden määrittämiseksi millilitraa kohti. Laimenna suspensio tuoreella viljelyalustalla solupitoisuudeksi 1 x 10^5 solua/ml ja jaa säädetty suspensio uusiin pulloihin jatkokäsittelyä varten.

Jakosuhde	1–5
Kylvötiheys	1–5 × 10^5 solua/ml
Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa
Sulamisen jälkeinen palautuminen	Sulatuksen jälkeen sentrifugoi solut 300×g:n voimalla 5 minuutin ajan, poista kryoprotektiivia sisältävä supernatantti ja suspendoi solut uudelleen tuoreeseen, esilämmitettyyn täydelliseen elatusaineeseen pitoisuudella 1 × 10^5 solua/ml. Anna solujen toipua ja lisääntyä vähintään 24–48 tuntia ennen ensimmäistä siirtoa.

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Rotua / alalajia	BALB/c (NSI/1-myeloomatausta)
Luovuttajan ikä	Ikä määrittelemätön
Etnisyys	Ei sovelleta (hiiren solulinja)

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB