DH82

305003

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

DH-82-celler, som stammer fra malign histiocytose hos en ti år gammel golden retriever-hann, er en hjørnestein i studiet av immunologi og relaterte sykdommer hos hunder.
Disse cellene har en makrofaglignende morfologi som gjenspeiler de viktigste funksjonene til humane makrofager, og er dermed en relevant modell for å undersøke ulike aspekter ved hundens helse, særlig immunsystemrelaterte tilstander.
Et kjennetegn ved DH-82-cellene er deres evne til å fagocytere lateks-partikler, en viktig funksjon hos makrofager som er ansvarlige for eliminering av fremmede stoffer i kroppen. Denne egenskapen gjør DH-82-celler til et robust verktøy for å undersøke immunresponsen hos hunder, spesielt i forbindelse med infeksjoner og inflammatoriske sykdommer. Uttrykket av Fc-gamma-reseptorer i DH-82-celler er et bemerkelsesverdig trekk.
Disse reseptorene er en viktig del av immunresponsen, ettersom de binder seg til antistoffer og letter fagocytose av antistoffbelagte patogener eller partikler. Dette gjør DH-82-celler spesielt verdifulle i studier som fokuserer på immunresponser og antistoffavhengig cellulær cytotoksisitet (ADCC). DH-82-celler uttrykker derimot ikke Fc mu- og C3b-reseptorer.
Fraværet av Fc mu-reseptorer, som vanligvis finnes på B-celler og er involvert i antigenpresentasjon, og C3b-reseptorer, som binder seg til komplementproteiner i immunresponser, gir en kontrollert setting for å undersøke spesifikke immunmekanismer som kan påvirkes av disse reseptorene.
I tillegg produserer DH-82-celler ikke IL-1, et sentralt cytokin i inflammatoriske responser. Dette gir et unikt perspektiv for å undersøke IL-1s rolle i ulike biologiske prosesser og forstå IL-1-medierte sykdommer.
Når det gjelder infeksjonssykdommer, har DH-82-celler vist seg å være spesielt nyttige i studier av monocytisk ehrlichiose hos hund (CME), en flåttbåren sykdom forårsaket av Ehrlichia canis.
Cellene gir et gunstig miljø for bakteriens vekst, noe som bidrar til utforskningen av sykdommens utvikling og potensielle behandlinger. DH-82-cellenes fordoblingstid på ca. 26 timer er også et kritisk aspekt ved bruken av dem, noe som påvirker forsøksdesignet og tolkningen av resultatene.

Sykdom	Histiocytært sarkom hos hund

Synonymer

- DH-82
- DH 82

KLASSIFISERING

Organisme	Hund
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Tilhenger
Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Makrofaglignende
Celletype	Histiocytt

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

DH82 (Cytion-katalognummer 305003)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-skattenummer	9615
Cellosaurus	CVCL_2018

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

EMEM (MEM Eagle), m: 2 mM L-Glutamin, m: 2,2 g/L NaHCO3, m: EBSS (Cytion artikkelnummer 820100a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS og 1 % NEAA

Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Subkultivering

Fjern det gamle mediet fra de adherente cellene, og vask dem med PBS uten kalsium og magnesium. Bruk 3-5 ml PBS for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber. Dekk deretter cellene helt med Accutase, med 1-2 ml for T25-kolber og 2,5 ml for T75-kolber. La cellene inkubere i romtemperatur i 8-10 minutter for å løsne dem. Etter inkubasjon blandes cellene forsiktig med 10 ml medium for å resuspendere dem, og sentrifuger deretter ved 300xg i 3 minutter. Kast supernatanten, resuspender cellene i nytt medium, og overfør dem til nye kolber som allerede inneholder nytt medium.

Væskefornyelse	2 til 3 ganger per uke

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Rase / underart	Golden Retriever
Donorens alder	10 år

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes