DH82

305003

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

Bunky DH-82, získané z malígnej histiocytózy desaťročného samca zlatého retrievera, sú základným kameňom pri štúdiu imunológie psov a súvisiacich ochorení.
Tieto bunky vykazujú morfológiu podobnú makrofágom, ktorá odráža kľúčové funkcie ľudských makrofágov, čím poskytujú vhodný model na skúmanie rôznych aspektov zdravia psov, najmä stavov súvisiacich s imunitným systémom.
Charakteristickou vlastnosťou buniek DH-82 je ich schopnosť fagocytovať latexové častice, čo je základná funkcia makrofágov zodpovedných za elimináciu cudzorodých látok v tele. Táto vlastnosť stavia bunky DH-82 do pozície spoľahlivého nástroja na skúmanie imunitných reakcií psov, najmä v súvislosti s infekciami a zápalovými ochoreniami. Expresia Fc gama receptorov v bunkách DH-82 je pozoruhodnou vlastnosťou.
Tieto receptory sú neoddeliteľnou súčasťou imunitných reakcií, pretože sa viažu na protilátky a uľahčujú fagocytózu patogénov alebo častíc obalených protilátkami. To robí bunky DH-82 obzvlášť cennými v štúdiách zameraných na imunitné reakcie a bunkovú cytotoxicitu závislú od protilátok (ADCC). Naopak, bunky DH-82 neexprimujú receptory Fc mu a C3b.
Absencia Fc mu receptorov, ktoré sa zvyčajne nachádzajú na B bunkách a podieľajú sa na prezentácii antigénu, a C3b receptorov, ktoré sa v imunitných reakciách viažu na proteíny komplementu, poskytuje kontrolované prostredie na skúmanie špecifických imunitných mechanizmov, ktoré by mohli byť ovplyvnené týmito receptormi.
Okrem toho bunky DH-82 neprodukujú IL-1, kľúčový cytokín v zápalových reakciách. Táto vlastnosť ponúka jedinečnú perspektívu na skúmanie úlohy IL-1 v rôznych biologických procesoch a pochopenie chorôb sprostredkovaných IL-1.
V oblasti infekčných chorôb sa bunky DH-82 ukázali ako obzvlášť užitočné pri štúdiu psej monocytárnej ehrlichiózy (CME), ochorenia prenášaného kliešťami, ktoré spôsobuje Ehrlichia canis.
Bunky poskytujú priaznivé prostredie pre rast baktérie, čo pomáha pri skúmaní vývoja ochorenia a potenciálnej liečby. Čas zdvojenia buniek DH-82, približne 26 hodín, je tiež rozhodujúcim aspektom pri ich používaní, ktorý ovplyvňuje návrh experimentu a interpretáciu výsledkov.

Choroba	Histiocytárny sarkóm psov

Synonymá

- DH-82
- DH 82

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Pes
Sex	Muž
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Makrofágom podobné
Typ bunky	Histiocyty

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

DH82 (katalógové číslo Cytion 305003)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Daňové identifikačné číslo NCBI	9615
Cellosaurus	CVCL_2018

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamín, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion číslo článku 820100a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10% FBS a 1% NEAA

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmnožovanie kultúr

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Obnova kvapaliny	2 až 3-krát týždenne

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Plemeno / poddruh	Zlatý retriever
Vek darcu	10 rokov

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB