V79

305012

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apraksts

V79 šūnas ir Ķīnas kāmja plaušu fibroblastu šūnu līnija, ko parasti izmanto ģenētiskos, toksikoloģiskos un radiobioloģiskos pētījumos. To izcelsme ir Ķīnas kāmja plaušu audi, un tās ir īpaši novērtētas ātras augšanas ātruma un stabila kariotipa dēļ, kas padara tās par uzticamu modeli dažādiem laboratorijas pētījumiem.
Viens no galvenajiem V79 šūnu izmantošanas veidiem ir citotoksicitātes un genotoksicitātes testēšana. Šīs šūnas izmanto, lai novērtētu ķīmisko savienojumu un starojuma potenciālo DNS bojājošo ietekmi, sniedzot būtiskus datus riska novērtēšanai un drošības novērtēšanai. V79 šūnas ir ļoti jutīgas pret mutagēniem un kancerogēniem, tāpēc tās ir lieliska izvēle mutagenitātes testiem, piemēram, mikrokodolu testam un hromosomu aberāciju testam.
Radiācijas bioloģijā V79 šūnas izmanto, lai pētītu jonizējošā starojuma ietekmi uz šūnu struktūrām un novērtētu radioprotektīvo vielu efektivitāti. To jutība pret radiācijas izraisītiem bojājumiem ļauj pētniekiem pētīt DNS atjaunošanas, šūnu cikla apstāšanās un apoptozes mehānismus pēc dažādu veidu starojuma iedarbības.
V79 šūnas ir noderīgas arī farmakoloģiskajos pētījumos, jo īpaši zāļu skrīninga procesos, kur to stabila augšana un reproducējamība ir izdevīga augstas veiktspējas testos. Tās izmanto, lai pārbaudītu jaunu zāļu citotoksisko iedarbību un pētītu farmaceitisko savienojumu uzņemšanu šūnās un metabolismu.
Kopumā V79 šūnu līnija ir daudzpusīgs instruments biomedicīniskajos pētījumos, kas veicina izpratni par šūnu reakciju uz vides aģentiem un palīdz izstrādāt drošākus un efektīvākus terapeitiskos pasākumus.

Audums	Plaušas

Pieteikumi

V79 šūnas ir plaši izmantota un atzīta šūnu līnija bioloģiskajos pētījumos, jo īpaši DNS labošanas un DNS bojājumu izpētē. Šīm šūnām ir saīsināts šūnu cikls, tās ir viegli mutagēnizējamas, lai izveidotu stabilas mutantu līnijas, kurās trūkst DNS labošanas enzīmu un saistīto DNS bojājumu atbildes funkciju, un tās ir īpaši noderīgas gēnu toksicitātes noteikšanai, jo tām ir stabils kariotips un morfoloģija. V79 šūnas ir plaši izmantotas pētījumos par rentgena, UV starojuma un oksidētāju izraisītiem DNS bojājumiem un to labošanu, kā arī pētījumos par šūnu signalizācijas ceļiem, apoptozi, iekaisumu un dažādu ķīmisko vielu un savienojumu ietekmi uz šūnu augšanu un dzīvotspēju. To plašais pielietojums pētniecībā apliecina to lietderību un nozīmi bioloģijas zinātnē.

Sinonīmi

- V-79
- V 79
- Strain V
- V79-1
- GM00215
- GM-215
- GM00215A
- GM16136
- UCW 100

KLASIFIKĀCIJA

Organisms	Ķīniešu kāmītis
Sekss	Vīrietis
Augšanas īpašības	Atbalstītājs
Bioloģiskās drošības līmenis	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

RAKSTURLIELUMI

Morfoloģija	Fibroblasti

IDENTIFIKATORI

Atsauce

V79 (Cytion kataloga numurs 305012)

NCBI nodokļu identifikācijas numurs	10029
Cellosaurus	CVCL_2234

APSTRĀDE UN AUDZĒŠANA

Barotne

DMEM, w: 4,5 g/l glikozes, w: 4 mM L-glutamīna, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM nātrija piruvāta (Cytion izstrādājuma numurs 820300a)

Inkubācijas vide	37°C, 5%CO2, mitrināta atmosfēra.

Papildinājumi

Papildināt barotni ar 10% FBS

Disociācijas reaģents	Accutase

Pārstādīšana

Noņemt veco barotni no pielipušajām šūnām un mazgāt tās ar PBS, kurā nav kalcija un magnija. T25 kolbām izmantojiet 3-5 ml PBS, bet T75 kolbām - 5-10 ml. Pēc tam pilnībā pārklājiet šūnas ar Accutase, izmantojot 1-2 ml T25 kolbām un 2,5 ml T75 kolbām. Ļaujiet šūnām inkubēties istabas temperatūrā 8-10 minūtes, lai tās atdalītos. Pēc inkubācijas uzmanīgi samaisiet šūnas ar 10 ml barotnes, lai tās atkārtoti suspendētu, pēc tam centrifugējiet 3 minūtes ar 300xg. Izmetiet supernatantu, atkārtoti suspendējiet šūnas svaigā barotnē un pārvietojiet tās jaunās kolbās, kurās jau ir svaiga barotne.

Šķidruma atjaunošana	2 līdz 3 reizes nedēļā

Atkausēšana un kultivēšana

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITĀTES KONTROLE UN KRIOKONSERVĀCIJA

Sterilitāte

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.
Lai pārliecinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.

Saldēšanas barotne	Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanos un samazinātu krioinducēto stresu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpeklī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starpposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Piegādes nosacījumi

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidruma daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

JURIDISKIE JAUTĀJUMI UN DROŠĪBA

Drošības pasākumi

Plānojot uzglabāt kriokviālu šķidrā slāpeklī turpmākai atkausēšanai, obligāti jāievēro stingri drošības pasākumi. Ir nepieciešami piemēroti aizsargcimdi un apģērbs, un, pārvietojot sasaldētos paraugus uz šķidrā slāpekļa tvertni vai no tās, ir jālieto sejas maska vai aizsargbrilles. Tas jādara, lai mazinātu traumu risku, ko var radīt iespējamas kriokrioviālu eksplozijas, kas var izraisīt asu fragmentu izmešanu.

Garantija

Uzņēmumā Cytion mēs atbalstām savu produktu kvalitāti un dzīvotspēju.
Mēs garantējam, ka mūsu šūnas būs dzīvotspējīgas kultivēšanas sākumā 60 dienas pēc nosūtīšanas no mūsu ražotnēm.
Mēs nodrošinām, ka visi materiāli atbilst analīzes sertifikātā un/vai produkta lapā aprakstītajām specifikācijām
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu <a href=""/"/Kas mēs esam/garantija/"" hreflang=""x-default"">Garantijas paziņojumu

Nepieciešams materiālu nodošanas līgums	Yes