SK-N-SH

305028

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buněčná linie SK-N-SH je model lidského neuroblastomu původně vytvořený z aspirátu kostní dřeně dítěte s metastazujícím neuroblastomem. Je široce využívána ve výzkumu rakoviny, zejména pro studium diferenciace neuronů, biologie neuroblastomu a terapeutických zásahů. Tato buněčná linie je pozoruhodná svou heterogenitou a schopností diferencovat se za vhodných podmínek na neuronální a ne-neuronální fenotypy, což věrně napodobuje buněčnou rozmanitost pozorovanou v neuroblastomových nádorech.
Chromozomová analýza SK-N-SH odhalila téměř diploidní karyotyp s numerickými a strukturálními abnormalitami. Linie důsledně vykazuje trizomii chromozomu 7 spolu s translokacemi zahrnujícími chromozomy 9 a 17. Konkrétně se úsek chromozomu 17 translokuje na chromozom 22, což vede k částečné trizomii chromozomu 17. Navzdory těmto změnám vykazují buňky SK-N-SH ve srovnání s jinými modely neuroblastomu relativně stabilní karyotypové rysy, což je činí vhodnými pro studium chromozomálních aberací u neuroblastomu.
Z funkčního hlediska mají buňky SK-N-SH neuronální vlastnosti a exprimují neuroblastomové markery, včetně enzymů syntézy neurotransmiterů, což svědčí o jejich původu z nervového hřebene. Důležité je, že buňky SK-N-SH lze indukovat k diferenciaci na buňky podobné neuronům s morfologickými a biochemickými změnami. K vyvolání této diferenciace se běžně používají látky, jako je kyselina retinová, což vede ke zvýšenému růstu neuritů a expresi neuronálních markerů. Tato vlastnost činí z SK-N-SH cenný nástroj pro zkoumání cest neuronální diferenciace, neurotoxicity a terapeutických cílů neuroblastomu.
SK-N-SH slouží jako robustní a univerzální model pro zkoumání progrese neuroblastomu, neuronální diferenciace a terapeutických odpovědí. Jeho karyotypová stabilita a schopnost diferenciace do neuronálních fenotypů poskytují platformu pro translační výzkum dětských nádorů a vývoje neuronů.

Tkáň	Mozek
Nemoc	Neuroblastom
Místo metastázy	Kostní dřeň

Synonyma

- SK N SH
- SKN-SH
- SK-NSH
- SKNSH
- NSH

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Žena
Růstové vlastnosti	Přívrženec
Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Epitelové

IDENTIFIKÁTORY

Citace

SK-N-SH (katalogové číslo Cytion 305028)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0531

EXPRESE A NÁCHYLNOST

Exprese proteinů

Aktivátoru plazminogenu, vykazuje zvýšenou expresi M-Csf po léčbě peptidem amyloidu beta.

Exprese antigenu

Krevní skupina A, Rh□

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/l NaHCO3, w: EBSS (číslo článku Cytion 820100a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 10 % FBS a 1 % NEAA

Disociační činidlo	Accutase

Subkultivace

Odstraňte staré médium z adherovaných buněk a promyjte je PBS bez vápníku a hořčíku. Pro baňky T25 použijte 3-5 ml PBS a pro baňky T75 5-10 ml. Poté buňky zcela zakryjte přípravkem Accutase, přičemž použijte 1-2 ml pro baňky T25 a 2,5 ml pro baňky T75. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 8-10 minut, aby se oddělily. Po inkubaci jemně promíchejte buňky s 10 ml média, aby byly znovu suspendovány, a poté je odstřeďte při 300xg po dobu 3 minut. Supernatant vyhoďte, buňky znovu rozpusťte v čerstvém médiu a přeneste je do nových baněk, které již obsahují čerstvé médium.

Obnova tekutin	2 až 3krát týdně

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme 50% základní médium + 40% FBS + 10% DMSO nebo CM-1 (katalogové číslo Cytion 800100), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu vyvolaného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	4 roky
Etnická příslušnost	Evropská

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB