SK-N-SH

305028

GENEL BILGILER

Açıklama

SK-N-SH hücre hattı, orijinal olarak metastatik nöroblastomlu bir çocuğun kemik iliği aspiratından oluşturulan bir insan nöroblastom modelidir. Kanser araştırmalarında, özellikle nöronal farklılaşma, nöroblastom biyolojisi ve terapötik müdahaleleri incelemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Hücre hattı, heterojenliği ve uygun koşullar altında nöronal benzeri ve nöronal olmayan fenotiplere farklılaşma yeteneği ile dikkat çekmektedir; bu da nöroblastom tümörlerinde gözlenen hücresel çeşitliliği yakından taklit etmektedir.
SK-N-SH'nin kromozom analizi, sayısal ve yapısal anormallikler içeren neredeyse diploid bir karyotip ortaya koymuştur. Bu hat, kromozom 9 ve 17'yi içeren translokasyonlarla birlikte sürekli olarak kromozom 7'nin trizomisini göstermektedir. Spesifik olarak, kromozom 17'nin bir segmenti kromozom 22'ye transloke olarak kromozom 17'nin kısmi trizomisine neden olur. Bu değişikliklere rağmen, SK-N-SH hücreleri diğer nöroblastom modellerine kıyasla nispeten stabil karyotipik özellikler sergiler ve bu da onları nöroblastomda kromozomal aberasyonları incelemek için uygun hale getirir.
İşlevsel olarak, SK-N-SH hücreleri nöronal özelliklere sahiptir ve nöral krest kökenlerinin göstergesi olan nörotransmitter sentez enzimleri de dahil olmak üzere nöroblastom belirteçlerini ifade eder. Daha da önemlisi, SK-N-SH hücreleri morfolojik ve biyokimyasal değişikliklerle nöron benzeri hücrelere farklılaşmak üzere uyarılabilir. Retinoik asit gibi ajanlar bu farklılaşmayı tetiklemek için yaygın olarak kullanılır, bu da nörit büyümesinin artmasına ve nöronal belirteçlerin ekspresyonuna neden olur. Bu özellik SK-N-SH'yi nöronal farklılaşma yollarını, nörotoksisiteyi ve nöroblastom terapötik hedeflerini incelemek için değerli bir araç haline getirmektedir.
SK-N-SH, nöroblastom progresyonu, nöronal farklılaşma ve terapötik yanıtların araştırılması için sağlam ve çok yönlü bir model olarak hizmet eder. Karyotipik stabilitesi ve nöronal fenotiplere farklılaşma yeteneği, pediatrik kanserler ve nöronal gelişim üzerine translasyonel araştırmalar için bir platform sağlar.

Doku	Beyin
Hastalık	Nöroblastom
Metastaz yeri	Kemik iliği

Eş anlamlılar

- SK N SH
- SKN-SH
- SK-NSH
- SKNSH
- NSH

SINIFLANDIRMA

Canlı	İnsan
Cinsiyet	Kadın
Büyüme özellikleri	Bağlı
Biyogüvenlik seviyesi	1

ÖZELLIKLER

Morfoloji	Epitelyal

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

SK-N-SH (Cytion katalog numarası 305028)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	9606
Cellosaurus	CVCL_0531

İFADE VE DUYARLILIK

Protein ekspresyonu

Plazminojen Aktivatörü, Amiloid-Beta Peptid ile Tedaviden Sonra M-Csf Ekspresyonunda Artış Gösterir.

Antijen ekspresyonu

Kan Grubu A, Rh□

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion makale numarası 820100a)

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %10 FBS ve %1 NEAA ile takviye edin

Ayrıştırma reaktifi	Accutase

Alt kültür oluşturma

Yapışık hücrelerden eski ortamı çıkarın ve kalsiyum ve magnezyum içermeyen PBS ile yıkayın. T25 şişeleri için 3-5 ml PBS ve T75 şişeleri için 5-10 ml kullanın. Ardından, T25 flasklar için 1-2 ml ve T75 flasklar için 2,5 ml kullanarak hücreleri Accutase ile tamamen kaplayın. Hücreleri ayırmak için oda sıcaklığında 8-10 dakika inkübasyona bırakın. İnkübasyondan sonra, hücreleri yeniden süspanse etmek için 10 ml besiyeriyle hafifçe karıştırın, ardından 300xg'de 3 dakika santrifüjleyin. Süpernatantı atın, hücreleri taze besiyerinde yeniden süspanse edin ve zaten taze besiyeri içeren yeni şişelere aktarın.

Sıvı değişimi	haftada 2 ila 3 kez

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, iyileşmeyi artırmak ve kriyo kaynaklı stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren %50 bazal ortam + %40 FBS + %10 DMSO veya CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

BAĞIŞÇI

Bağışçının yaşı	4 yıl
Etnik köken	Avrupa

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir	Yes