T98G

305030

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Garis sel T98G adalah model glioblastoma multiforme manusia yang berasal dari pasien pria berusia 61 tahun. Sel ini dibuat untuk mempelajari mekanisme molekuler tumorigenesis, proliferasi sel, dan transformasi. Sel T98G menunjukkan kombinasi unik dari karakteristik seluler normal dan yang berubah, yang menjadikannya model yang berharga untuk menyelidiki biologi kanker. Secara khusus, meskipun sel T98G bersifat abadi dan mampu melakukan pertumbuhan yang tidak bergantung pada jangkar, sel ini tetap memiliki kemampuan untuk mengalami penangkapan fase G1 dalam kondisi fase stasioner, suatu sifat yang biasanya dikaitkan dengan sel normal.
Dalam hal karakteristik pertumbuhan, sel T98G menunjukkan kemandirian penambatan, seperti yang ditunjukkan oleh kemampuan mereka untuk membentuk koloni dalam metilselulosa, media semi-padat. Namun, tidak seperti banyak garis sel yang ditransformasikan, mereka berhenti pada fase G1 dari siklus sel ketika mengalami kondisi kepadatan sel yang tinggi atau konsentrasi serum yang rendah. Kemampuan unik untuk mengalami penangkapan G1 dalam kondisi ini membedakan T98G dari garis sel kanker lainnya, seperti HeLa atau sel T98 orang tua, yang terus berkembang biak dalam keadaan yang sama. Fenotipe ini menunjukkan bahwa meskipun sel T98G bertransformasi, mereka mempertahankan mekanisme pengaturan tertentu yang mengontrol perkembangan siklus sel.
Secara sitogenetik, sel T98G sangat aneuploid, dengan jumlah kromosom modal 124-126, yang menunjukkan ketidakstabilan kromosom yang signifikan. Kehadiran kromosom penanda dan kromosom kecil dalam kariotipe mereka lebih lanjut mencerminkan perubahan genetik yang umumnya terkait dengan glioblastoma multiforme. Terlepas dari sifatnya yang berubah dan aneuploid, sel T98G tidak bersifat tumorigenik ketika disuntikkan ke dalam tikus telanjang, menunjukkan bahwa kemandirian penjangkaran saja tidak cukup untuk tumorigenitas.
Garis sel T98G berfungsi sebagai alat penting untuk mempelajari perkembangan glioblastoma, regulasi siklus sel, dan interaksi antara perilaku seluler normal dan yang berubah. Kemampuannya untuk mempertahankan aspek-aspek penangkapan G1 normal menjadikannya model yang sangat berguna untuk mengeksplorasi mekanisme yang mendasari transformasi seluler, pos pemeriksaan siklus sel, dan target terapeutik untuk glioblastoma.

Tisu	Otak
Penyakit	Glioblastoma

Sinonim

- T 98 G
- T-98G
- T98 G
- T98-G

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Laki-laki
Sifat-sifat pertumbuhan	Pengikut
Tingkat keamanan hayati	1

KARAKTERISTIK

Morfologi	Fibroblast
Waktu penggandaan	40 jam

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

T98G (nomor katalog Cytion 305030)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0556

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2,2 g/L $NaHCO_3$, w: EBSS (nomor artikel Cytion 820100a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO_2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Lengkapi media dengan 10% FBS dan 1% NEAA

Reagen disosiasi	Accutase

Perbanyakan sel

Buang media lama dari sel yang melekat dan cuci dengan PBS yang tidak mengandung kalsium dan magnesium. Untuk labu T25, gunakan 3-5 ml PBS, dan untuk labu T75, gunakan 5-10 ml. Kemudian, tutupi sel sepenuhnya dengan Accutase, menggunakan 1-2 ml untuk labu T25 dan 2,5 ml untuk labu T75. Biarkan sel diinkubasi pada suhu kamar selama 8-10 menit untuk melepaskannya. Setelah inkubasi, campurkan sel secara perlahan dengan 10 ml medium untuk meresuspensi sel, kemudian sentrifugasi pada 300xg selama 3 menit. Buang supernatan, resuspensi sel dalam medium segar, dan pindahkan ke dalam labu baru yang sudah berisi medium segar.

Pergantian cairan	2 hingga 3 kali per minggu

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan 50% media basal + 40% FBS + 10% DMSO, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	61 tahun
Etnis	Eropa

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes