22RV1

305037

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

22Rv1-cellelinjen er en human prostatakræftcellelinje, der blev etableret fra et xenotransplantat, der blev initieret ved podning af en hormonresistent prostatakræftcellelinje, CWR22, i athymiske nøgenmus. CWR22-xenograftet stammede fra et primært prostatakarcinom. Ved regression efter kastration og efterfølgende tilbagefald blev 22Rv1-cellelinjen etableret fra den tilbagefaldne tumor, som udviste androgenuafhængig vækst.
22Rv1-cellerne udtrykker androgenreceptoren (AR) og prostataspecifikt antigen (PSA), som er vigtige markører inden for forskning i prostatakræft og terapeutisk målretning. Især indeholder denne cellelinje en variant af AR kendt som AR-V7. Denne splejsningsvariant mangler det ligandbindende domæne, hvilket gør det muligt for den at forblive konstitutivt aktiv og bidrage til den androgenuafhængige spredning af 22Rv1-celler, et kritisk aspekt af kastrationsresistent prostatakræft (CRPC).
22Rv1-cellelinjen bruges i vid udstrækning til at undersøge de mekanismer, der ligger til grund for overgangen fra androgenafhængig til androgenuafhængig prostatakræftvækst, en vigtig udfordring i behandlingen af fremskreden prostatakræft. 22Rv1-celler har muliggjort betydelige fremskridt i forståelsen af CRPC's molekylærbiologi, herunder AR-varianters rolle i resistens over for androgen deprivationsterapi (ADT) og udvikling af nye terapeutiske strategier, der sigter mod at overvinde denne resistens.
Kort sagt fungerer 22Rv1-cellelinjen som en kritisk model til undersøgelse af CRPC. Disse celler udviser androgenuafhængig vækst og udtrykker vigtige prostatacancermarkører som AR og PSA og indeholder især AR-V7-varianten, som er konstitutivt aktiv på grund af fraværet af det ligandbindende domæne. 22Rv1-cellelinjens unikke egenskaber gør den uvurderlig til at udforske overgangen fra androgenafhængig til uafhængig vækst i prostatakræft og dermed bidrage til udviklingen af nye terapeutiske tilgange til at tackle fremskredne stadier af sygdommen.

Væv	Prostata
Sygdom	Prostata-karcinom

Synonymer

- 22Rv1
- 22Rv-1
- 22rV1
- CWR-22rv1
- CWR22-Rv1
- CWR22R-V1
- CWR22-R1
- CWR22Rv1
- CWR22R

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Mand
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	2

EGENSKABER

Morfologi	Epitelial
Tumorfremkaldende	Yeees

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Fordoblingstid	40 til 60 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

22RV1 (Cytion-katalognummer 305037)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1045

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Antigenudtryk

Prostata-specifikt antigen (PSA)

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	Voksen
Etnisk tilhørsforhold	Europæisk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href="/Who-we-are/Warranty/" hreflang="x-default">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes