22RV1

305037

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

22Rv1-cellelinjen er en human prostatakarsinomcellelinje som ble etablert fra et xenotransplantat initiert ved inokulering av en hormonresistent prostatakreftcellelinje, CWR22, i athymiske nakne mus. CWR22-xenograftet ble avledet fra et primært prostatakarsinom. Ved regresjon etter kastrasjon og påfølgende tilbakefall ble 22Rv1-cellelinjen etablert fra den tilbakefallende svulsten, som viste androgenuavhengig vekst.
22Rv1-cellene uttrykker androgenreseptoren (AR) og prostataspesifikt antigen (PSA), som er viktige markører i forskning på og behandling av prostatakreft. Denne cellelinjen inneholder en variant av AR kjent som AR-V7. Denne spleisevarianten mangler ligandbindingsdomenet, noe som gjør at den forblir konstitutivt aktiv og bidrar til den androgenuavhengige proliferasjonen av 22Rv1-celler, et kritisk aspekt ved kastrasjonsresistent prostatakreft (CRPC).
22Rv1-cellelinjen brukes i stor utstrekning til å undersøke mekanismene som ligger til grunn for overgangen fra androgenavhengig til androgenuavhengig prostatakreftvekst, en viktig utfordring i behandlingen av avansert prostatakreft. 22Rv1-celler har bidratt til betydelige fremskritt i forståelsen av molekylærbiologien ved CRPC, inkludert AR-varianters rolle i resistens mot androgen deprivasjonsterapi (ADT) og utvikling av nye behandlingsstrategier som tar sikte på å overvinne denne resistensen.
22Rv1-cellelinjen er en viktig modell for å studere CRPC. Disse cellene vokser androgenuavhengig og uttrykker viktige prostatakreftmarkører som AR og PSA, og de inneholder AR-V7-varianten, som er konstitutivt aktiv på grunn av fraværet av det ligandbindende domenet. 22Rv1-cellelinjens unike egenskaper gjør den uvurderlig når det gjelder å utforske overgangen fra androgenavhengig til androgenuavhengig vekst i prostatakreft, og dermed bidra til utviklingen av nye behandlingsmetoder for å takle avanserte stadier av sykdommen.

Vev	Prostata
Sykdom	Prostatakarsinom

Synonymer

- 22Rv1
- 22Rv-1
- 22rV1
- CWR-22rv1
- CWR22-Rv1
- CWR22R-V1
- CWR22-R1
- CWR22Rv1
- CWR22R

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Tilhenger
Biosikkerhetsnivå	2

EGENSKAPER

Morfologi	Epitelial
Tumorinduserende	Ja

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Fordoblingstid	40 til 60 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

22RV1 (Cytion-katalognummer 305037)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1045

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Antigenuttrykk

Prostata-spesifikt antigen (PSA)

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820700a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS

Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Subkultivering

Fjern det gamle mediet fra de adherente cellene, og vask dem med PBS uten kalsium og magnesium. Bruk 3-5 ml PBS for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber. Dekk deretter cellene helt med Accutase, med 1-2 ml for T25-kolber og 2,5 ml for T75-kolber. La cellene inkubere i romtemperatur i 8-10 minutter for å løsne dem. Etter inkubasjon blandes cellene forsiktig med 10 ml medium for å resuspendere dem, og sentrifuger deretter ved 300xg i 3 minutter. Kast supernatanten, resuspender cellene i nytt medium, og overfør dem til nye kolber som allerede inneholder nytt medium.

Væskefornyelse	2 til 3 ganger per uke

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	Voksen
Etnisitet	Europeisk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes