22RV1

305037

INFORMACJE OGÓLNE

Opis

Linia komórkowa 22Rv1 jest ludzką linią komórkową raka prostaty, która została utworzona z ksenoprzeszczepu zainicjowanego przez inokulację hormonoopornej linii komórkowej raka prostaty, CWR22, do atymicznych nagich myszy. Ksenograft CWR22 pochodził z pierwotnego raka prostaty. Po regresji po kastracji i późniejszym nawrocie, linia komórkowa 22Rv1 została utworzona z nawrotowego guza, który wykazywał wzrost niezależny od androgenów.
komórki 22Rv1 wykazują ekspresję receptora androgenowego (AR) i antygenu specyficznego dla prostaty (PSA), istotnych markerów w badaniach nad rakiem prostaty i terapii. Warto zauważyć, że ta linia komórkowa zawiera wariant AR znany jako AR-V7. W tym wariancie splicingu brakuje domeny wiążącej ligand, co pozwala mu pozostać konstytutywnie aktywnym i przyczyniać się do niezależnej od androgenów proliferacji komórek 22Rv1, krytycznego aspektu raka prostaty opornego na kastrację (CRPC).
Linia komórkowa 22Rv1 jest szeroko stosowana do badania mechanizmów leżących u podstaw przejścia od wzrostu raka prostaty zależnego od androgenów do wzrostu niezależnego od androgenów, co stanowi kluczowe wyzwanie w leczeniu zaawansowanego raka prostaty.
komórki 22Rv1 przyczyniły się do znacznego postępu w zrozumieniu biologii molekularnej CRPC, w tym roli wariantów AR w oporności na terapię deprywacją androgenów (ADT) i rozwoju nowych strategii terapeutycznych mających na celu przezwyciężenie tej oporności.
Podsumowując, linia komórkowa 22Rv1 służy jako krytyczny model do badania CRPC. Wykazując wzrost niezależny od androgenów, komórki te wyrażają kluczowe markery raka prostaty, takie jak AR i PSA, a zwłaszcza zawierają wariant AR-V7, który jest konstytutywnie aktywny z powodu braku domeny wiążącej ligand. Unikalne właściwości linii komórkowej 22Rv1 sprawiają, że jest ona nieoceniona w badaniu przejścia od wzrostu zależnego od androgenów do wzrostu niezależnego w raku prostaty, a tym samym pomaga w opracowywaniu nowych podejść terapeutycznych do walki z zaawansowanymi stadiami choroby.

Chusteczka	Prostata
Choroba	Rak gruczołu krokowego

Synonimy

- 22Rv1
- 22Rv-1
- 22rV1
- CWR-22rv1
- CWR22-Rv1
- CWR22R-V1
- CWR22-R1
- CWR22Rv1
- CWR22R

KLASYFIKACJA

Organizm	Człowiek
Seks	Mężczyzna
Właściwości związane ze wzrostem	Zwolennik
Poziom bezpieczeństwa biologicznego	2

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Morfologia	Nabłonek
Nowotworotwórczy	Tak

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Czas podwojenia	40 do 60 godzin

IDENTYFIKATORY

Źródło

22RV1 (numer katalogowy Cytion 305037)

Numer identyfikacji podatkowej NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1045

EKSPRESJA I PODATNOŚĆ

Ekspresja antygenu

Antygen specyficzny dla prostaty (PSA)

POSTĘPOWANIE I HODOWLA

Pożywka hodowlana

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnej glutaminy, w: 2,0 g/L NaHCO3 (numer artykułu Cytion 820700a)

Atmosfera inkubacyjna	37°C, 5%CO2, nawilżona atmosfera.

Suplementy

Uzupełnić podłoże 10% FBS

Odczynnik dysocjacyjny	Accutase

Hodowla komórek w subkulturze

Usuń starą pożywkę z przylegających komórek i przemyj je PBS, który nie zawiera wapnia i magnezu. W przypadku kolb T25 należy użyć 3-5 ml PBS, a w przypadku kolb T75 5-10 ml. Następnie całkowicie pokryj komórki Accutase, używając 1-2 ml dla kolb T25 i 2,5 ml dla kolb T75. Pozwól komórkom inkubować w temperaturze pokojowej przez 8-10 minut, aby je oddzielić. Po inkubacji delikatnie wymieszaj komórki z 10 ml pożywki, aby ponownie je zawiesić, a następnie odwiruj przy 300xg przez 3 minuty. Odrzucić supernatant, ponownie zawiesić komórki w świeżej pożywce i przenieść je do nowych kolb zawierających już świeżą pożywkę.

Odnawianie płynów	2 do 3 razy w tygodniu

Rozmrażanie i hodowla

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA JAKOŚCI I KRIOKONSERWACJA

Bezpłodność

Zanieczyszczenie mykoplazmą jest wykluczane przy użyciu zarówno testów opartych na PCR, jak i metod wykrywania mykoplazmy opartych na luminescencji.
Aby upewnić się, że nie ma zanieczyszczenia bakteriami, grzybami lub drożdżami, hodowle komórkowe są poddawane codziennym kontrolom wizualnym.

Pożywka do zamrażania	Jako pożywki do kriokonserwacji używamy kompletnej pożywki wzrostowej (w tym FBS) + 10% DMSO w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności po rozmrożeniu lub CM-1 (numer katalogowy Cytion 800100), która zawiera zoptymalizowane osmoprotektanty i stabilizatory metaboliczne w celu zwiększenia regeneracji i zmniejszenia stresu wywołanego kriokonserwacją.

Warunki przechowywania

W celu długotrwałego przechowywania należy umieścić fiolki w ciekłym azocie w fazie lotnej w temperaturze od -150 do -196 °C.
Przechowywanie w temperaturze -80 °C jest dopuszczalne tylko jako krótki etap przejściowy przed przeniesieniem do ciekłego azotu.

Warunki wysyłki

Linie komórkowe poddane kriokonserwacji są wysyłane w suchym lodzie w zatwierdzonych, izolowanych opakowaniach z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, aby utrzymać temperaturę około -78°C przez cały czas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy natychmiast sprawdzić pojemnik i bezzwłocznie przenieść fiolki do odpowiedniego miejsca przechowywania.

DARCZYŃCA

Wiek dawcy	Dorosły
Pochodzenie etniczne	Europejski

KWESTIE PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa

Planując przechowywanie kriofiolek w ciekłym azocie w celu ich późniejszego rozmrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Niezbędne są odpowiednie rękawice i odzież ochronna, a podczas przenoszenia zamrożonych próbek do lub ze zbiornika z ciekłym azotem wymagane jest stosowanie maski lub okularów ochronnych. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń spowodowanych potencjalnymi eksplozjami kriowialu podczas wyjmowania, które mogą skutkować wyrzuceniem ostrych fragmentów.

Gwarancja

W Cytion gwarantujemy jakość i żywotność naszych produktów.
Gwarantujemy, że nasze komórki będą żywotne na początku hodowli przez 60 dni po wysyłce z naszych zakładów.
Zapewniamy, że wszystkie materiały są zgodne ze specyfikacjami opisanymi w certyfikacie analizy i/lub karcie produktu
Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Oświadczeniu gwarancyjnym

Wymagana umowa o transferze materiałów	Yes