22RV1

305037

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

A linha celular 22Rv1 é uma linha celular de carcinoma da próstata humano que foi estabelecida a partir de um xenoenxerto iniciado pela inoculação de uma linha celular de cancro da próstata refractária às hormonas, CWR22, em ratinhos nus atímicos. O xenoenxerto CWR22 foi derivado de um carcinoma primário da próstata. Após regressão após castração e subsequente recidiva, a linha celular 22Rv1 foi estabelecida a partir do tumor recidivado, que apresentava um crescimento independente dos androgénios.
as células 22Rv1 expressam o recetor de androgénios (AR) e o antigénio específico da próstata (PSA), marcadores essenciais na investigação do cancro da próstata e na orientação terapêutica. Em particular, esta linha celular contém uma forma variante do AR conhecida como AR-V7. Esta variante de splice não possui o domínio de ligação ao ligando, o que lhe permite permanecer constitutivamente ativa e contribuir para a proliferação independente de androgénios das células 22Rv1, um aspeto crítico do cancro da próstata resistente à castração (CRPC).
A linha celular 22Rv1 é amplamente utilizada para investigar os mecanismos subjacentes à transição do crescimento do cancro da próstata dependente de androgénios para independente de androgénios, um desafio fundamental no tratamento do cancro da próstata avançado. as células 22Rv1 permitiram avanços significativos na compreensão da biologia molecular do CRPC, incluindo o papel das variantes do AR na resistência à terapia de privação de androgénio (ADT) e o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas destinadas a ultrapassar esta resistência.
Em resumo, a linha celular 22Rv1 serve como um modelo crítico para o estudo da CRPC. Apresentando um crescimento independente de androgénios, estas células expressam marcadores-chave do cancro da próstata, como o AR e o PSA, e contêm nomeadamente a variante AR-V7, que é constitutivamente ativa devido à ausência do domínio de ligação ao ligando. As propriedades únicas da linha celular 22Rv1 tornam-na inestimável para explorar a transição do crescimento dependente de androgénios para o crescimento independente no cancro da próstata e, assim, ajudar no desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para combater as fases avançadas da doença.

Tecido	Próstata
Doença	Carcinoma da próstata

Sinónimos

- 22Rv1
- 22Rv-1
- 22rV1
- CWR-22rv1
- CWR22-Rv1
- CWR22R-V1
- CWR22-R1
- CWR22Rv1
- CWR22R

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Masculino
Propriedades de crescimento	Aderente
Nível de biossegurança	2

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CARACTERÍSTICAS

Morfologia	Epitelial
Tumorigénico	Sim
Tempo de duplicação	40 a 60 horas

IDENTIFICADORES

Referência

22RV1 (número de catálogo da Cytion 305037)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1045

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Expressão do antígeno

Antigénio específico da próstata (PSA)

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

RPMI 1640, com: 2,0 mM de glutamina estável, com: 2,0 g/L NaHCO3 (número de artigo Cytion 820700a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS

Reagente de dissociação	Accutase

Subcultura

Retirar o meio antigo das células aderentes e lavá-las com PBS sem cálcio e magnésio. Nos frascos T25, utilizar 3-5 ml de PBS e nos frascos T75, 5-10 ml. Em seguida, cobrir completamente as células com Accutase, utilizando 1-2 ml para os frascos T25 e 2,5 ml para os frascos T75. Deixar as células incubar à temperatura ambiente durante 8-10 minutos para as destacar. Após a incubação, misturar suavemente as células com 10 ml de meio para as ressuspender e, em seguida, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Deitar fora o sobrenadante, ressuspender as células em meio fresco e transferi-las para novos frascos que já contenham meio fresco.

Renovação de fluidos	2 a 3 vezes por semana

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	Adulto
Etnia	Europeu

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes