Farage

305071

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

"Farage" ląstelių linija yra kilusi iš B limfocitų, gautų iš suaugusios moters, kuriai diagnozuota ne Hodžkino B ląstelių limfoma. Ši ląstelių linija yra ypač vertinga imunologiniams tyrimams dėl savo unikalių savybių ir reakcijų į įvairius dirgiklius. Farage ląstelės auga suspensijoje ir išsiskiria tuo, kad neišreiškia paviršinių ar citoplazminių imunoglobulinų, o tai rodo jų naudingumą tyrimams, kurių metu tiriamas imuninis atsakas be šių baltymų trukdžių.
Paveiktos interleukinu-4 (IL-4), Farage ląstelės pasižymi padidėjusia kelių žymenų, įskaitant CD23, CD54 ir CD58, raiška, tuo tarpu CD21, CD22 ir CD38 kiekis jose sumažėja. Ši paviršiaus žymenų moduliacija rodo IL-4 vaidmenį darant įtaką B ląstelių elgsenai ir yra naudingas modelis tiriant B ląstelių signalinius kelius ir reguliavimo mechanizmus. Be to, reakcija į gydymą forbolo 12-miristato 13-acetatu (PMA), dėl kurios sumažėja CD21 ir CD23 reguliacija, dar labiau patvirtina jo taikymą tiriant kinazių valdomą signalizaciją B ląstelėse.
Tai, kad Farage'o ląstelėse nėra terminalinės deoksinukleotidiltransferazės (TdT) ir rekombinaciją aktyvuojančių genų (RAG-1 ir RAG-2), patvirtina, kad jos priskiriamos brandžioms B ląstelėms, o ne pre-B ląstelėms. Šis aspektas yra labai svarbus tyrimams, skirtiems brandžioms B ląstelių vystymosi ar funkcijos stadijoms. Be to, šiose ląstelėse esantis Epšteino-Baro virusas (EBV) gali būti panaudotas tyrimuose, kuriuose tiriama viruso sąveika su šeimininko ląstelių mechanizmais, ypač atsižvelgiant į onkogeninius procesus limfocituose.

Audinys	Limfinė sistema
Liga	Difuzinė stambiųjų B ląstelių limfoma germinacinio centro B ląstelių tipas
Metastazių vieta	Limfmazgis

Sinonimai

- FARAGE
- Farage OL
- Farage Original Line

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žmogus
Seksas	Moteris
Augimo savybės	Pakaba
Biologinio saugumo lygis	2

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Limfoblastai
Laikas, per kurį skaičius padvigubėja	48 valandos

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

Farage (Cytion katalogo numeris 305071)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	9606
Cellosaurus	CVCL_3302

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

RPMI 1640, š: 2,0 mM stabilus glutaminas, š: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion gaminio numeris 820700a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % termiškai inaktyvintu FBS, pridėkite 2,5 g/l gliukozės ir 10 mM HEPES

Subkultūrinis auginimas

Gali būti auginamas iki 1,5–2 x 10^6 ląstelių/ml. Švelniai homogenizuokite ląstelių suspensiją kolboje, pipetuodami aukštyn ir žemyn, tada paimkite reprezentatyvią mėginį, kad nustatytumėte ląstelių tankį ml. Praskieskite suspensiją, kad pasiektumėte 5 x 10^5 ląstelių/ml koncentraciją šviežia kultūrinė terpė, ir paskirstykite pakoreguotą suspensiją į naujas kolbas tolesniam auginimui.

Sėjos tankis	5 x 10^5 ląstelių/ml
Skysčių atnaujinimas	2-3 kartus per savaitę

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Donoro amžius	70 metų
Etninė priklausomybė	Europos

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href=""/Kas mes esame/garantijos/" hreflang=""x-default"">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB