Farage

305071

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

Farage-cellelinjen stammer fra en B-lymfocytt avledet fra en voksen kvinne som har fått diagnosen non-Hodgkins B-celle-lymfom. Denne cellelinjen er spesielt verdifull i immunologiske studier på grunn av sine unike egenskaper og reaksjoner på ulike stimuli. Farage-celler vokser i suspensjon og uttrykker verken overflate- eller cytoplasmatiske immunglobuliner, noe som gjør dem anvendelige i studier som fokuserer på immunrespons uten forstyrrelser fra disse proteinene.
Når Farage-celler behandles med interleukin-4 (IL-4), øker uttrykket av flere markører, blant annet CD23, CD54 og CD58, samtidig som nivåene av CD21, CD22 og CD38 reduseres. Denne moduleringen av overflatemarkører tyder på at IL-4 påvirker B-cellenes atferd, og er en nyttig modell for å utforske signalveier og reguleringsmekanismer i B-celler. Dessuten støtter responsen på behandling med phorbol 12-myristat 13-acetat (PMA), som resulterer i nedregulering av CD21 og CD23, ytterligere IL-4s anvendelse i studier av kinasedrevet signalering i B-celler.
Fraværet av terminal deoksynukleotidyltransferase (TdT) og rekombinasjonsaktiverende gener (RAG-1 og RAG-2) i Farage-celler bekrefter deres klassifisering som modne B-celler snarere enn pre-B-celler. Dette aspektet er avgjørende for forskning rettet mot de modne stadiene av B-cellenes utvikling eller funksjon. I tillegg kan tilstedeværelsen av Epstein-Barr-virus (EBV) i disse cellene utnyttes i studier som undersøker virale interaksjoner med cellulære mekanismer i vertscellen, særlig i forbindelse med onkogene prosesser i lymfocytter.

Vev	Lymfesystemet
Sykdom	Diffust storcellet B-celle-lymfom av typen germinalsenter-B-celle
Metastaseområde	Lymfeknute

Synonymer

- FARAGE
- Farage OL
- Farage Original Line

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Kvinne
Vekstegenskaper	Oppheng
Biosikkerhetsnivå	2

EGENSKAPER

Morfologi	Lymfoblast
Fordoblingstid	48 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

Farage (Cytion-katalognummer 305071)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_3302

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820700a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler med 10 % varmeinaktivert FBS, tilsett 2,5 g/L glukose og 10 mM HEPES

Subkultivering

Kan dyrkes til 1,5-2 x 10^6 celler/ml. Homogeniser cellesuspensjonen forsiktig i kolben ved å pipettere opp og ned, og ta deretter en representativ prøve for å bestemme celletettheten per ml. Fortynn suspensjonen til en cellekonsentrasjon på 5 x 10^5 celler/ml med ferskt dyrkningsmedium, og fordel den justerte suspensjonen i nye kolber for videre dyrking.

Såtetthet	5 x 10^5 celler/ml
Væskefornyelse	2 til 3 ganger per uke

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	70 år
Etnisitet	Europeisk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes