Farage

305071

INFORMACJE OGÓLNE

Opis

Linia komórkowa Farage pochodzi z limfocytów B uzyskanych od dorosłej kobiety, u której zdiagnozowano chłoniaka nieziarniczego B-komórkowego. Ta linia komórkowa jest szczególnie cenna w badaniach immunologicznych ze względu na jej unikalne cechy i reakcje na różne bodźce. Komórki Farage rosną w zawiesinie i wyróżniają się brakiem ekspresji immunoglobulin powierzchniowych lub cytoplazmatycznych, co podkreśla ich użyteczność w badaniach skoncentrowanych na odpowiedzi immunologicznej bez ingerencji tych białek.
Po poddaniu działaniu interleukiny-4 (IL-4), komórki Farage wykazują wzrost ekspresji kilku markerów, w tym CD23, CD54 i CD58, jednocześnie wykazując zmniejszenie poziomów CD21, CD22 i CD38. Ta modulacja markerów powierzchniowych sugeruje rolę IL-4 w wpływaniu na zachowanie komórek B i stanowi przydatny model do badania szlaków sygnałowych i mechanizmów regulacyjnych w komórkach B. Co więcej, odpowiedź na leczenie 12-myristanem 13-octanu forbolu (PMA), która powoduje obniżenie regulacji CD21 i CD23, dodatkowo wspiera jego zastosowanie w badaniu sygnalizacji kinazowej w komórkach B.
Brak terminalnej transferazy deoksynukleotydylowej (TdT) i genów aktywujących rekombinację (RAG-1 i RAG-2) w komórkach Farage potwierdza ich klasyfikację jako dojrzałych komórek B, a nie komórek pre-B. Aspekt ten ma kluczowe znaczenie dla badań ukierunkowanych na dojrzałe etapy rozwoju lub funkcji komórek B. Dodatkowo, obecność wirusa Epsteina-Barr (EBV) w tych komórkach może być wykorzystana w badaniach nad interakcjami wirusa z mechanizmami komórkowymi gospodarza, szczególnie w kontekście procesów onkogennych w limfocytach.

Chusteczka	Układ limfatyczny
Choroba	Chłoniak rozlany z dużych komórek B typu zarodkowego z komórek B
Miejsce przerzutów	Węzeł chłonny

Synonimy

- FARAGE
- Farage OL
- Farage Original Line

KLASYFIKACJA

Organizm	Człowiek
Seks	Kobieta
Właściwości związane ze wzrostem	Zawieszenie
Poziom bezpieczeństwa biologicznego	2

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Morfologia	Limfoblast
Czas podwojenia	48 godzin

IDENTYFIKATORY

Źródło

Farage (numer katalogowy Cytion 305071)

Numer identyfikacji podatkowej NCBI	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_3302

POSTĘPOWANIE I HODOWLA

Pożywka hodowlana

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnej glutaminy, w: 2,0 g/L NaHCO3 (numer artykułu Cytion 820700a)

Atmosfera inkubacyjna	37°C, 5%CO2, nawilżona atmosfera.

Suplementy

Uzupełnić podłoże 10% FBS inaktywowanym termicznie, dodać 2,5 g/l glukozy i 10 mM HEPES

Hodowla komórek w subkulturze

Można hodować do 1,5-2 x 10^6 komórek/ml. Delikatnie zhomogenizować zawiesinę komórek w kolbie, pipetując w górę i w dół, a następnie pobrać reprezentatywną próbkę w celu określenia gęstości komórek na ml. Rozcieńczyć zawiesinę, aby uzyskać stężenie komórek wynoszące 5 x 10^5 komórek/ml za pomocą świeżej pożywki hodowlanej, a następnie podzielić dostosowaną zawiesinę na nowe kolby w celu dalszej hodowli.

Gęstość wysiewu	5 x 10^5 komórek/ml
Odnawianie płynów	2 do 3 razy w tygodniu

Rozmrażanie i hodowla

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA JAKOŚCI I KRIOKONSERWACJA

Bezpłodność

Zanieczyszczenie mykoplazmą jest wykluczane przy użyciu zarówno testów opartych na PCR, jak i metod wykrywania mykoplazmy opartych na luminescencji.
Aby upewnić się, że nie ma zanieczyszczenia bakteriami, grzybami lub drożdżami, hodowle komórkowe są poddawane codziennym kontrolom wizualnym.

Pożywka do zamrażania	Jako pożywki do kriokonserwacji używamy kompletnej pożywki wzrostowej (w tym FBS) + 10% DMSO w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności po rozmrożeniu lub CM-1 (numer katalogowy Cytion 800100), która zawiera zoptymalizowane osmoprotektanty i stabilizatory metaboliczne w celu zwiększenia regeneracji i zmniejszenia stresu wywołanego kriokonserwacją.

Warunki przechowywania

W celu długotrwałego przechowywania należy umieścić fiolki w ciekłym azocie w fazie lotnej w temperaturze od -150 do -196 °C. Przechowywanie w temperaturze -80 °C jest dopuszczalne tylko jako krótki etap przejściowy przed przeniesieniem do ciekłego azotu.

Warunki wysyłki

Linie komórkowe poddane kriokonserwacji są wysyłane w suchym lodzie w zatwierdzonych, izolowanych opakowaniach z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, aby utrzymać temperaturę około -78°C przez cały czas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy natychmiast sprawdzić pojemnik i bezzwłocznie przenieść fiolki do odpowiedniego miejsca przechowywania.

DARCZYŃCA

Wiek dawcy	70 lat
Pochodzenie etniczne	Europejski

KWESTIE PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa

Planując przechowywanie kriofiolek w ciekłym azocie w celu ich późniejszego rozmrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Niezbędne są odpowiednie rękawice i odzież ochronna, a podczas przenoszenia zamrożonych próbek do lub ze zbiornika z ciekłym azotem wymagane jest stosowanie maski lub okularów ochronnych. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń spowodowanych potencjalnymi eksplozjami kriowialu podczas wyjmowania, które mogą skutkować wyrzuceniem ostrych fragmentów.

Gwarancja

W Cytion gwarantujemy jakość i żywotność naszych produktów.
Gwarantujemy, że nasze komórki będą żywotne na początku hodowli przez 60 dni po wysyłce z naszych zakładów.
Zapewniamy, że wszystkie materiały są zgodne ze specyfikacjami opisanymi w certyfikacie analizy i/lub karcie produktu
Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Oświadczeniu gwarancyjnym

Wymagana umowa o transferze materiałów	Yes