Farage

305071

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

Bunková línia Farage pochádza z B lymfocytov získaných od dospelej ženy s diagnózou non-Hodgkinovho B-bunkového lymfómu. Táto bunková línia je mimoriadne cenná v imunologických štúdiách vďaka svojim jedinečným vlastnostiam a reakciám na rôzne podnety. Bunky Farage rastú v suspenzii a vyznačujú sa tým, že neexprimujú povrchové ani cytoplazmatické imunoglobulíny, čo zvýrazňuje ich užitočnosť v štúdiách zameraných na imunitnú odpoveď bez interferencie týchto proteínov.
Pri liečbe interleukínom-4 (IL-4) vykazujú Farageove bunky zvýšenie expresie niekoľkých markerov vrátane CD23, CD54 a CD58, pričom vykazujú zníženie hladín CD21, CD22 a CD38. Táto modulácia povrchových markerov naznačuje úlohu IL-4 pri ovplyvňovaní správania B-buniek a poskytuje užitočný model na skúmanie signálnych dráh a regulačných mechanizmov v B-bunkách. Okrem toho reakcia na liečbu fosbol 12-myristátom 13-acetátom (PMA), ktorá vedie k zníženiu regulácie CD21 a CD23, ďalej podporuje jeho použitie pri štúdiu signalizácie riadenej kinázou v B-bunkách.
Absencia terminálnej deoxynukleotidyltransferázy (TdT) a génov aktivujúcich rekombináciu (RAG-1 a RAG-2) vo Faragových bunkách potvrdzuje ich klasifikáciu skôr ako zrelých B-buniek než ako pre-B-buniek. Tento aspekt je rozhodujúci pre výskum zameraný na zrelé štádiá vývoja alebo funkcie B-buniek. Okrem toho prítomnosť vírusu Epsteina-Barrovej (EBV) v týchto bunkách možno využiť v štúdiách skúmajúcich interakcie vírusu s mechanizmami hostiteľských buniek, najmä v kontexte onkogénnych procesov v lymfocytoch.

Tkanivo	Lymfatický systém
Choroba	Difúzny veľkobunkový B-lymfóm typu B-buniek germinálneho centra
Miesto metastáz	Lymfatická uzlina

Synonymá

- FARAGE
- Farage OL
- Farage Original Line

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Žena
Rastové vlastnosti	Zavesenie
Úroveň biologickej bezpečnosti	2

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Lymfoblast
Doba zdvojnásobenia	48 hodín

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

Farage (katalógové číslo Cytion 305071)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_3302

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % tepelne inaktivovaného FBS, pridajte 2,5 g/l glukózy a 10 mM HEPES

Rozmnožovanie kultúr

Môže sa kultivovať na 1,5–2 x 10^6 buniek/ml. Jemne homogenizujte bunkovú suspenziu v banke pipetovaním hore a dole, potom odoberte reprezentatívnu vzorku na stanovenie hustoty buniek na ml. Suspenziu zrieďte čerstvým kultivačným médiom, aby ste dosiahli koncentráciu buniek 5 x 10^5 buniek/ml, a upravenú suspenziu rozdeľte do nových baniek na ďalšiu kultiváciu.

Hustota výsevu	5 x 10^5 buniek/ml
Obnova kvapaliny	2 až 3-krát týždenne

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	70 rokov
Etnická príslušnosť	Európska

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes