KYSE-30

305094

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

KYSE-30 on hyvin erilaistunut ihmisen ruokatorven levyepiteelisolusyöpä (ESCC), joka on peräisin aikuispotilaan primaarikasvaimesta. Tämä solulinja on osa KYSE-sarjaa, ja se perustettiin ruokatorven syövän molekyyli- ja soluominaisuuksien tutkimiseksi. KYSE-30-solut ovat huomattavan nopeasti lisääntyviä, ja niiden kaksinkertaistumisaika on 20,8 tuntia, mikä tekee niistä vankan mallin in vitro -syöpätutkimukseen. Nämä solut kasvavat pääasiassa adherenttisina monokerroksina, joilla on tyypillinen monikulmion muoto ja yhtenäinen ulkonäkö vaihekontrastimikroskopiassa. Niiden kasvumalli on tyypillinen epiteelisoluista peräisin oleville syöpäsoluille, ja ne muodostavat tiiviisti pakkautuneita pesäkkeitä, joilla on taipumus kasautua epäjärjestyksessä, mikä kuvastaa sen kasvaimen invasiivista luonnetta, josta ne ovat peräisin.
Geneettisesti KYSE-30 on merkittävä, koska siinä on muutoksia keskeisissä kasvainsuppressorigeeneissä. Solulinjalla on p16- (INK4a) ja p15- (INK4b) geenien villityyppinen konfiguraatio, mutta siinä on huomattava pistemutaatio p16-geenissä, joka johtaa ennenaikaiseen stop-kodoniin, joka johtaa typistettyyn, toimimattomaan proteiiniin. Tämä mutaatio vaikuttaa todennäköisesti solusyklin hallinnan menettämiseen, mikä edistää syöpäsoluille ominaista hallitsematonta lisääntymistä. Villiintyneen p15-geenin säilyminen viittaa kuitenkin siihen, että p16-geenin muutoksilla on kriittisempi rooli KYSE-30:n onkogeneesissä, mikä voi olla merkityksellistä tutkimuksissa, joissa keskitytään näiden geenien erilaisiin rooleihin syövässä.
KYSE-30 on tumorigeeninen, kuten sen kyky muodostaa kasvaimia, kun se ruiskutetaan atyymisiin nude-hiiriin, mikä tekee siitä erinomaisen mallin ESCC:n in vivo -tutkimuksiin. KYSE-30-solujen muodostamien kasvainten histologinen tutkimus osoittaa samanlaisia piirteitä kuin alkuperäisessä levyepiteelisolusyövässä, mikä antaa uskollisen kuvan taudista. Tämä solulinja on korvaamaton kasvainten syntymekanismien, ruokatorven syöpää aiheuttavien geneettisten ja epigeneettisten muutosten sekä kohdennettujen hoitojen kehittämisen tutkimuksessa, vaikka se ei sovellukaan terapeuttisiin tai in vivo -sovelluksiin.

Kudos	Ruokatorven levyepiteeli
Sairaus	Ruokatorven okasolusyöpä

Synonyymit

- Kyse-30
- KYSE 30
- KYSE30
- Kyse30
- KYSE0030

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Mies
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Epiteelimäinen, pitkällä pseudopodilla varustettu, epiteelimäinen
Kaksinkertaistumisaika	20-30 tuntia

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

TUNNISTEET

Lähdeviite

KYSE-30 (Cytionin tuotenumero 305094)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_1351

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

Sekoita Ham's F12 ja RPMI 1640 suhteessa 50:50 (Cytionin artikkelinumerot 820600a ja 820702a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Accutase

Soluviljely

Poista vanha väliaine tarttuneista soluista ja pese ne PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia. Käytä T25-pulloissa 3-5 ml PBS:ää ja T75-pulloissa 5-10 ml. Peitä sitten solut kokonaan Accutase-valmisteella, käyttäen 1-2 ml T25-pulloissa ja 2,5 ml T75-pulloissa. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 8-10 minuuttia solujen irtoamiseksi. Inkuboinnin jälkeen solut sekoitetaan varovasti 10 ml:n väliaineella niiden resuspendoimiseksi ja sentrifugoidaan sitten 300xg:n nopeudella 3 minuutin ajan. Hävitä supernatantti, suspendoi solut uudelleen tuoreeseen väliaineeseen ja siirrä ne uusiin pulloihin, jotka sisältävät jo tuoretta väliaineita.

Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	64 vuotta
Etnisyys	Aasialainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB