HT-1376

305100

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія HT-1376 отримана з карциноми сечового міхура людини, а саме перехідно-клітинної карциноми 3 ступеня. Ця клітинна лінія була створена з пухлини, отриманої шляхом трансуретральної резекції у дорослої пацієнтки, яка страждала на інвазивну карциному сечового міхура в анамнезі. Клітини HT-1376 мають епітеліальні характеристики, включаючи наявність мікроворсинок і тонофібрил, які вказують на їх епітеліальне походження. Крім того, ці клітини мають кілька маркерних хромосом, які відрізняють їх від інших відомих пухлинних клітинних ліній. Відомо, що клітини HT-1376 ростуть у м'якому агарі і мають високу пухлиногенність, утворюючи пухлини при введенні мишам і хом'якам з ослабленим імунітетом.
HT-1376 має важливе значення в дослідженнях раку сечового міхура завдяки своєму генетичному профілю, включаючи помітні зміни в хромосомній ділянці 9p21. Ця ділянка часто зазнає великих гомозиготних делецій, що призводить до інактивації важливих генів-супресорів пухлин, таких як CDKN2, CDKN2B і MTAP. Ці делеції часто зустрічаються при раку сечового міхура і мають вирішальне значення для розуміння молекулярних механізмів, що лежать в основі пухлиноутворення. Наприклад, втрата CDKN2 і CDKN2B пов'язана з порушенням регуляції клітинного циклу, що є ключовою подією в прогресуванні раку. Крім того, клітини HT-1376 були досліджені на предмет експресії білка p16, продукту гена CDKN2, що часто корелює з відсутністю експресії pRb, іншого білка-супресора пухлин.
Клітинну лінію HT-1376 також використовували у вірусологічних дослідженнях для оцінки наявності пухлинних вірусів, хоча в цих клітинах не було виявлено експресії вірусів. Це робить HT-1376 цінною моделлю для вивчення невірусних механізмів розвитку і прогресування раку сечового міхура. Генетичні зміни клітинної лінії та її здатність рости in vitro та in vivo забезпечують надійну платформу для доклінічних досліджень, включаючи тестування ліків та вивчення нових терапевтичних стратегій, спрямованих на конкретні генетичні шляхи розвитку раку сечового міхура.

Тканина	Сечовий міхур
Хвороба	Карцинома сечового міхура

Синоніми

- HT1376
- HT 1376
- HT 1376.T

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Жінка
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Епітеліальний
Пухлиноутворювальний	Так
Час подвоєння	31 година

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

HT-1376 (номер за каталогом Cytion 305100)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_1292

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Експресія білків

Фібринолітична активність, інтерферон

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

EMEM (MEM Eagle), w: 2 мМ L-глутамін, w: 2,2 г/л NaHCO3, w: EBSS (цит. номер 820100a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS та 1% NEAA

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Оновлення рідини	2-3 рази на тиждень

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми.
Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	58 років
Етнічна приналежність	Європейський

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes