MS751

305115

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

MS751 - це пухлинна лінія клітин карциноми шийки матки людини, виділена з матки пацієнтки з епідермоїдною карциномою. Клітини були отримані з метастатичного лімфатичного вузла, і вони утворюють низькодиференційовану епідермоїдну карциному (ступінь III) при ксенотрансплантації голим мишам. Пухлинна і метастатична природа клітин MS751 робить їх цінною моделлю для вивчення процесів, пов'язаних з метастазуванням раку шийки матки і прогресуванням пухлини. Ці клітини особливо корисні для дослідження епітеліально-мезенхімального переходу (EMT), інвазії та метастазування, особливо у випадку низькодиференційованої карциноми. Однією з ключових молекулярних особливостей MS751 є наявність послідовностей вірусу папіломи людини (ВПЛ). Спочатку повідомлялося, що він містить ВПЛ-18, але останні дослідження показали, що клітини MS751 містять часткові послідовності ВПЛ-45, особливо з області E6/E7, які експресуються у вигляді полі(A)+ РНК. Онкопротеїни E6 і E7 добре відомі своєю роллю в порушенні супресорних функцій пухлин p53 і Rb відповідно, які сприяють неконтрольованому поділу клітин і сприяють онкогенезу. Наявність цих вірусних послідовностей робить MS751 дуже актуальною для досліджень ВПЛ-асоційованого раку шийки матки, зокрема для вивчення того, як ВПЛ-45 сприяє злоякісності клітин шийки матки.

Клітини MS751 мають епітеліальну морфологію, характерну для багатьох клітинних ліній раку шийки матки. Вони широко використовуються для дослідження молекулярних механізмів, що лежать в основі ВПЛ-опосередкованого канцерогенезу, а також для розробки ліків і терапевтичного скринінгу. Враховуючи їх метастатичне походження та наявність послідовностей ВПЛ, MS751 є важливою моделлю для вивчення прогресування раку шийки матки та тестування терапевтичних стратегій, спрямованих як на вірусні, так і на пов'язані з пухлиною шляхи.

Тканина	Шийка матки
Хвороба	Плоскоклітинна карцинома шийки матки, спричинена вірусом папіломи людини
Місце метастазування	Лімфатичний вузол

Синоніми

- MS-751
- MS 751

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Епітеліальний
Пухлиноутворювальний	Так, у голих мишей утворює погано диференційовану епідермоїдну карциному (ступіньIII).

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

MS751 (номер у каталозі Cytion 305115)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_4996

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Експресія антигену

Група крові AB, Rh□

Віруси

ВПЛ18, ВПЛ45

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

EMEM (MEM Eagle), w: 2 мМ L-глутамін, w: 2,2 г/л NaHCO3, w: EBSS (цит. номер 820100a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS, 1% NEAA та 1,0 мМ піруват натрію

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Оновлення рідини	2-3 рази на тиждень

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	47 років

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes