HTh-7

305128

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

HTh-7-solulinja on ihmisen anaplastisen kilpirauhassyövän (ATC) malli, jota käytetään laajalti tämän pahanlaatuisen kasvaimen aggressiivisuuden tutkimiseen. ATC:lle on ominaista nopea eteneminen, vastustuskyky tavanomaisille hoitomuodoille ja huono ennuste. HTh-7-soluissa esiintyy ATC:lle tyypillisiä monimutkaisia kromosomipoikkeavuuksia, mukaan lukien tiettyjen kromosomialueiden, kuten kromosomin 20q, spesifiset lisäykset ja menetykset, jotka liittyvät syövän etenemiseen. Näissä soluissa ei esiinny yleistä BRAF V600E -mutaatioita, joka on yleinen papillaarisessa kilpirauhassyövässä mutta harvinaisempi ATC:ssä, mikä korostaa eri kilpirauhassyöpien syöpää aiheuttavien tekijöiden monimuotoisuutta.
HTh-7-solulinjan genomin tarkempi karakterisointi paljastaa usein esiintyviä mutaatioita TERT-promoottorissa, mikä on aggressiivisten kilpirauhassyöpien tunnusmerkki. Soluissa esiintyy deleetio villityypin TERT-kopiossa, mikä viittaa homotsygoottisen TERT-promoottorimutaation läsnäoloon, joka todennäköisesti edistää niiden aggressiivista fenotyyppiä edistämällä telomeraasin aktivaatiota. HTh-7-soluissa on myös mutaatioita TP53-geenissä, mikä johtaa p53-funktion täydelliseen menetykseen, mikä on yleistä ATC:ssä ja genomin epävakauden aiheuttaja. Tämä funktion menetys liittyy usein muihin mutaatioihin, kuten PTEN-geenissä ja PI3K/AKT/mTOR-reitin geeneissä, mikä korostaa entisestään HTh-7:n hyödyllisyyttä mallina ATC:n molekyylitason mekanismien tutkimuksessa.
HTh-7-solut osoittavat myös merkittävää dedifferentoitumista, mikä näkyy alhaisina kilpirauhasen erilaistumispisteinä (TDS), jotka ovat samanlaisia kuin ATC-kasvaimissa. Tämä dedifferentoituminen on tyypillistä pitkälle edenneille kilpirauhassyöville ja näkyy kilpirauhaskohtaisen geenieksпression merkittävänä menetyksenä, mikä tekee HTh-7:stä ihanteellisen mallin kilpirauhassyövän dedifferentoitumisen mekanismien ja siihen liittyvien terapeuttisten haasteiden tutkimiseen. Solulinjan geneettinen profiili, mukaan lukien muutokset TP53- ja TERT-geeneissä, korostaa sen merkitystä prekliinisissä tutkimuksissa, joiden tavoitteena on tutkia uusia terapeuttisia lähestymistapoja ATC:n hoitoon, erityisesti niitä, jotka kohdistuvat telomeerien ylläpitoon ja p53-mekanismeihin.

Kudos	Kilpirauhanen
Sairaus	Kilpirauhasen anaplastinen karsinooma

Synonyymit

- Hth7
- HTh 7
- HTh-7
- Uhth-7
- U-hth7
- U-Hth7

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Nainen
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Epiteeli

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

TUNNISTEET

Lähdeviite

HTh-7 (Cytionin tuotenumero 305128)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_6289

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,1 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Accutase

Soluviljely

Poista vanha väliaine tarttuneista soluista ja pese ne PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia. Käytä T25-pulloissa 3-5 ml PBS:ää ja T75-pulloissa 5-10 ml. Peitä sitten solut kokonaan Accutase-valmisteella, käyttäen 1-2 ml T25-pulloissa ja 2,5 ml T75-pulloissa. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 8-10 minuuttia solujen irtoamiseksi. Inkuboinnin jälkeen solut sekoitetaan varovasti 10 ml:n väliaineella niiden resuspendoimiseksi ja sentrifugoidaan sitten 300xg:n nopeudella 3 minuutin ajan. Hävitä supernatantti, suspendoi solut uudelleen tuoreeseen väliaineeseen ja siirrä ne uusiin pulloihin, jotka sisältävät jo tuoretta väliaineita.

Kylvötiheys	1–3 x 10^4 solua/cm^2
Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	74 vuotta

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB