RF/6A

305150

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

RF/6A er en cellelinje af endotelceller fra nethinden og årehinden hos rhesusmakak (Macaca mulatta), der er etableret ud fra føtalt væv fra årehinden og nethinden. Cellelinjen vokser som et vedhæftende monolag med epitelagtig morfologi. RF/6A-celler bevarer vigtige endotelcellekarakteristika, herunder ekspression af faktor VIII (von Willebrand-faktor), fibronektin og Weibel-Palade-granuler, der kan påvises ved elektronmikroskopi — hvor sidstnævnte bekræfter deres endotelcelleidentitet. Linjen blev oprindeligt etableret til studier af vaskularisering i nethinden og årehinden og er blevet bredt anvendt som en primat-endotelmodel til forskning i okulær angiogenese.
RF/6A kan anvendes i forskning i okulær angiogenese, undersøgelser af vaskularisering i nethinden og årehinden, evaluering af antiangiogene midler (VEGF-hæmmere, bevacizumab, ranibizumab), modellering af aldersrelateret makuladegeneration (AMD), biologi ved diabetisk retinopati samt vurdering af vaskulær permeabilitet i det okulære mikromiljø. Da RF/6A stammer fra ikke-menneskelige primater (NHP), ligger den tættere på den menneskelige nethindens vaskulære biologi end endotelmodeller fra gnavere, især i forbindelse med undersøgelser, der involverer primatspecifikke VEGF-isoformresponser og okulær farmakologi. Linjen anvendes almindeligvis i rørdannelsesassays, migrationsassays og VEGF-stimuleringsforsøg.

Væv	Årehinde, nethinde
Sygdom	Normalt endotel i nethinden og årehinden (foster; ikke-tumorfremkaldende)
Metastasested	Ikke relevant (normal cellelinje fra fosterets nethinde og årehinde)

Anvendelser

Forskning i okulær angiogenese; vaskularisering af nethinden og årehinden; evaluering af anti-VEGF-behandling (bevacizumab, ranibizumab); modellering af AMD og diabetisk retinopati; rørdannelsesforsøg; vaskulær permeabilitet; nethindeendotelmodel hos NHP-primater

KLASSIFICERING

Organisme	Rhesusmakak
Køn	Uspecificeret
Vækstegenskaber	Tilhænger
GMO-status	GMO-fri

Oplysninger om GMO-status

No genetic modification; wildtype rhesus macaque fetal retinal choroidal endothelial cell line

Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Epitel-lignende
Celletype	Endotheliale celler
Fordoblingstid	ca. 24 til 36 timer

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

RF/6A (Cytion-katalognummer 305150)

NCBI-skattenummer	9544
Cellosaurus	CVCL_4552

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Proteinekspression

Faktor VIII, fibronektin

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/L $NaHCO_3$, w: EBSS (Cytion artikelnummer 820100a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO_2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS og 1% NEAA

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Opdelingsforhold	1 til 5
Såtæthed	1 til 2 × 10^4 celler/cm^2
Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen
Genopretning efter optøning	Efter optøning udplades cellerne med en tæthed på 5 × 10^4 celler/cm^2, og der skal gå mindst 24 timer, før det første medieskift foretages, så cellerne kan hæfte sig fast. Lad ikke kulturerne nå fuld konfluens, da kontaktinhibering kan reducere den endoteliale fænotype.

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	Foster
Etnisk tilhørsforhold	Ikke relevant (cellelinje fra ikke-menneskelige primater; Macaca mulatta)

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes