AtT-20

305161

GENERAL INFORMATION

Description

הוא קו תאים מאובחן היטב של גידול בבלוטת יותרת המוח של עכברים, שמקורו בתאי יותרת המוח הקדמית. תאים אלה מקורם בזן AtT-20 קו התאים עכברים המכונה AtT-20/D16v-F2, והם משמשים בעיקר לחקר תפקוד וויסות בלוטת יותרת המוח, עם דגש מיוחד על סינתזה והפרשה של הורמון אדרנוקורטיקוטרופי (ACTH). ה-ACTH חיוני לתפקוד בלוטת יותרת הכליה, והוא גורם מרכזי בתגובת הגוף למתח ובוויסות חילוף החומרים.
תאי AtT-20 מציגים מאפיינים טיפוסיים החשובים למחקרים בנוירואנדוקרינולוגיה ופרמקולוגיה, כגון ייצור והפרשה של פרו-אופיומלנוקורטין (POMC), והורמונים היפותלמיים אחרים, מה שהופך אותם למודל מצוין לחקר (CRH) התאים מגיבים להורמון משחרר קורטיקוטרופין-ACTH. המולקולה הקודמת ל יכולים לשמש לחקר המנגנונים של עיבוד, אריזה והפרשת הורמוני פפטיד, בזכות AtT-20 במבחנה. בנוסף, תאי (HPA) ציר ההיפותלמוס-היפופיזה-אדרנל מסלולי ההפרשה המוגדרים היטב שלהם.
שימשו במחקרים שונים, כולל מחקרים שהתמקדו בפרופילי ביטוי גנים בתנאי טיפול שונים, מסלולי איתות תאיים המעורבים AtT-20 מבחינת יישומים, תאי והשפעות של שינויים גנטיים על הפרשת הורמונים. תאים אלה חשובים גם בהערכת התכונות הפרמקולוגיות של תרופות פוטנציאליות המיועדות ל-cAMP לרכיבי ציר HPA.

Tissue	היפופיזה
Disease	גידולים בבלוטת יותרת המוח של העכבר

Synonyms

- AtT20
- AtT 20
- ATT-20

CLASSIFICATION

Organism	Mouse
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	תאים קטנים ומעוגלים

IDENTIFIERS

Citation

AtT-20 (מספר קטלוג Cytion 305161)

NCBI TaxID	10090
Cellosaurus	CVCL_2300

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

הורמון אדרנוקורטיקוטרופי (ACTH)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

Ham's F12K Medium, w: 2.0 mM L-Glutamine, w: 2.0 mM Sodium pyruvate, w: 2.5 g/L NaHCO3 (מספר פריט Cytion 820608a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

2.5% הוסף לתמיסה FBS, 15% סרום סוסים

Dissociation reagent	אקוטאז

Subculturing

תאים/מ"ל ושמרו על ריכוז התאים בטווח של 10^5 x שמרו על התרבויות על ידי הוספה או החלפה תקופתית של המצע. התחילו את התרבויות בצפיפות של 5 3×10^5 עד 1 x 10^6 תאים/מ"ל לצורך צמיחה מיטבית.

Fluid renewal	עד 3 פעמים בשבוע 2

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו- (מספר קטלוגי Cytion 800100), CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך C-שורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78° ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Breed / subspecies	LAF1

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">הצהרת האחריות שלנו

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB