# C127

305169

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### Popis

Bunky C127 pochádzajúce z epitelových tkanív mliečnej žľazy myší sú nepostrádateľnou bunkovou líniou cicavcov, ktorá vytvára pevný základ pre množstvo biologických štúdií. Tieto bunky prešli prísnym inžinierskym procesom, ktorý zahŕňa infekciu špeciálne navrhnutými vírusmi, ktoré do ich genómu integrujú T7 RNA polymerázu riadenú vírusovým promótorom. Flexibilita buniek C127 sa ďalej zvyšuje zavedením ďalšieho rekombinantného vírusu, ktorý nesie cDNA regulátora transmembránovej vodivosti cystickej fibrózy (CFTR) pod kontrolou promótora T7, prípadne transfekčného plazmidu nesúceho rovnaký promótor. Toto genetické usporiadanie umožňuje presnú kontrolu nad expresiou proteínov, prispôsobenú na produkciu špecifických proteínov, čím sa bunky C127 stávajú výnimočným nástrojom na štúdie expresie proteínov.
Epitelová povaha buniek C127, ktorá odráža ich odvodenie z tkanív mliečnej žľazy, podporuje ich adherentný rast. Vykazujú rýchlu proliferáciu a možno ich použiť na skúmanie bunkových procesov, rastu a diferenciácie v rôznych experimentálnych podmienkach. Jedinečné genetické modifikácie prítomné v týchto bunkách z nich robia ideálny model pre experimenty so stabilnou transfekciou buniek, čo umožňuje výskumníkom vkladať cudzí genetický materiál a skúmať funkcie génov, interakcie proteínov a dôsledky genetických modifikácií. Okrem toho sa čoraz viac uznáva ich využitie v 3D bunkových kultúrach, ktoré poskytujú poznatky o interakciách medzi bunkami, morfogenéze tkanív a modelovaní chorôb s väčším fyziologickým významom, čím sa ich využiteľnosť rozširuje nad rámec tradičných 2D kultúr.

| | |
|---|---|
| **Tkanivo** | Mliečna žľaza |
| **Choroba** | Zhubné nádory mliečnej žľazy myší |

### Synonymá

- C-127

## KLASIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| **Organizmus** | Myš |
| **Sex** | Žena |
| **Rastové vlastnosti** | Prívrženec |
| **Úroveň biologickej bezpečnosti** | 1 |

## CHARAKTERISTIKY

| | |
|---|---|
| **Morfológia** | Epitelové |

## IDENTIFIKÁTORY

### Citácia

C127 (katalógové číslo Cytion 305169)

| | |
|---|---|
| **Daňové identifikačné číslo NCBI** | 10090 |
| **Cellosaurus** | CVCL_6550 |

## MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

### Kultivačné médium

DMEM, w: 4,5 g/l glukózy, w: 4 mM L-glutamínu, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM pyruvátu sodného (číslo výrobku Cytion 820300a)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

| | |
|---|---|
| **Inkubačná atmosféra** | 37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra. |

**Doplnky stravy**

Doplňte médium o 10 % FBS

| | |
|---|---|
| **Disociačné činidlo** | Accutase |

**Rozmnožovanie kultúr**

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

| | |
|---|---|
| **Obnova kvapaliny** | 2 až 3-krát týždenne |

**Rozmrazovanie a kultivácia**

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

**Sterilita**

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

| | |
|---|---|
| **Mrazové médium** | Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo. |

**Podmienky skladovania**

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

**Dopravné podmienky**

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

## DARCA

| | |
|---|---|
| **Plemeno / poddruh** | RIII |

## PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

**Bezpečnostné opatrenia**

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

**Záruka**

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

| | |
|---|---|
| **Je potrebná dohoda o prenose materiálu** | Yes |