L Wnt-3A

305184

GENERAL INFORMATION

Description

L Wnt-3A □□□□ L □□ Wnt-3A □□□□□□□□ Wnt □□□□□□□□□□□□□□□ Wnt □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Wnt-3A □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

Wnt-3A

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM□□ 4.5 g/L □□□□4 mM L-□□□□□3.7 g/L $NaHCO_3$ □ 1.0 mM □□□□□Cytion □□□□ 820300a□

Incubation atmosphere	37°C□5% CO_2□□□□□□

Supplements

□□□□□□□ 10% FBS □ 0.4 mg/mL G-418

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PBS□□□□□T25□□□□□3-5□□PBS□T75□□□□□□5-10□□□ □□□□ Accutase □□□□□□□T25 □□□□□ 1–2 □□□T75 □□□□□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□ 8–10 □□□□□□□□ □□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 300xg □□ 3 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Donor age	100 □

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

□□□