RAG

305190

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

RAG-solulinja on BALB/c-hiirten munuaisten adenokarsinoomasta peräisin oleva 8-asaguaniinille vastustuskykyinen mutantti, joka ei palaudu. Tämä linja kehitettiin vuorottelemalla eläimestä kudosviljelmään siirtymisiä, jotta saatiin rikastettua kasvaimen aiheuttavaa populaatiota ja samalla eliminoitua normaalit stroomaaliset fibroblastit. RAG-soluilla on ameboidinen tai epitelioidinen morfologia, jossa on näkyviä sytoplasmaprosesseja, ja ne ovat resistenttejä hypoksantiini-guaniinifosforibosyylitransferaasista (HGPRT) riippuvaisille valintamenetelmille entsyymipuutoksensa vuoksi. Tämä resistenssi on helpottanut niiden käyttöä biokemiallisissa valintajärjestelmissä somaattisten solujen hybridisaatiokokeissa.
RAG-soluja käytetään laajalti somaattisten solujen fuusiotutkimusten vanhempien linjana, koska ne ovat yhteensopivia inaktivoitua Sendai-virusta käyttävien fuusiomenetelmien kanssa. Kun ne fuusioidaan muiden solulinjojen, kuten LM(TK-) tai WI-38:n, kanssa, hybridit säilyttävät merkkikromosomit ja osoittavat metabolisten puutosten biokemiallista komplementaarisuutta. Nämä hybridit ovat olleet tärkeitä geneettisten säätelyelementtien kartoittamisessa ja geenien ilmentymisen tutkimisessa, erityisesti munuaisiin liittyvien entsyymien, kuten ES-2:n esteraasin, osalta. RAG-hybridit tarjoavat tietoa sekä lajin sisäisestä että lajin sisäisestä kromosomierottelusta ja funktionaalisesta genomitiikasta.
Sen lisäksi, että RAG-solut ovat hybridisaatiotutkimuksissa, ne ovat toimineet mallina geenien ekspression epigeneettisen säätelyn tutkimisessa. Hybridisoluissa, joissa on mukana RAG, esiintyy usein tiettyjen geneettisten ominaisuuksien häviämistä ja uudelleen ilmenemistä riippuen tiettyjen kromosomien säilymisestä tai häviämisestä. Tämä tekee RAG-solulinjasta arvokkaan välineen geneettisen säätelyn ja kromosomistabiilisuuden dynamiikan ymmärtämisessä kasvainsoluissa.

Kudos	Munuaiset
Sairaus	Hiiren munuaiskarsinooma

Synonyymit

- Rag

LUOKITTELU

Organismi	Hiiri
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Amoeboidi

TUNNISTEET

Lähdeviite

RAG (Cytion-tuotenumero 305190)

NCBI-verotunnus	10090
Cellosaurus	CVCL_3575

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Proteiinin ilmentyminen

Munuaisspesifinen esteraasi-2 (ES-2)

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamiini, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytionin artikkelinumero 820100a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 % FBS:llä ja 1 % NEAA:lla

Dissosiaatioreagenssi	Accutase

Soluviljely

Poista vanha väliaine tarttuneista soluista ja pese ne PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia. Käytä T25-pulloissa 3-5 ml PBS:ää ja T75-pulloissa 5-10 ml. Peitä sitten solut kokonaan Accutase-valmisteella, käyttäen 1-2 ml T25-pulloissa ja 2,5 ml T75-pulloissa. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 8-10 minuuttia solujen irtoamiseksi. Inkuboinnin jälkeen solut sekoitetaan varovasti 10 ml:n väliaineella niiden resuspendoimiseksi ja sentrifugoidaan sitten 300xg:n nopeudella 3 minuutin ajan. Hävitä supernatantti, suspendoi solut uudelleen tuoreeseen väliaineeseen ja siirrä ne uusiin pulloihin, jotka sisältävät jo tuoretta väliaineita.

Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Rotua / alalajia	BALB/c

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes