NRK

305195

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

NRK-cellelinjen, der stammer fra en Rattus norvegicus (rotte)-nyre, er et uvurderligt værktøj i biologisk forskning. Disse celler har en epithelial morfologi, hvilket betyder, at de danner lag, der dækker organernes overflader og beskytter mod fremmede stoffer.
Epitelceller, som NRK-celler, udviser specifikke egenskaber. De har en generøs mængde cytoplasma og indeholder mange granula. Disse celler tjener forskellige kropslige funktioner, hvor nogle fungerer som absorberende eller beskyttende midler, mens andre primært fungerer som sekretoriske celler.
I nyrernes tilfælde spiller epitelcellerne en afgørende rolle i lagringen og den efterfølgende udskillelse af udskillelsesmaterialer. Det gør NRK-cellelinjen særligt velegnet til at studere nyrefysiologi. Ved at bruge disse celler kan forskere undersøge de komplicerede processer, der er involveret i nyrefunktionen, og få indsigt i forskellige aspekter af nyrernes fysiologi.
Desuden er NRK-cellelinjen ikke begrænset til at studere nyrefysiologi alene. Disse alsidige celler kan også bruges i kræftforskning. Deres epitelmorfologi og oprindelse fra en normal rottenyre gør dem til en fremragende model til undersøgelse af kræftcellers adfærd og egenskaber i et kontrolleret miljø.
En anvendelse, der udnytter NRK-cellernes unikke egenskaber, er 3D-celledyrkning. Denne teknik indebærer dyrkning af celler i en tredimensionel matrix, der efterligner det naturlige cellemiljø mere end traditionel todimensionel dyrkning. NRK-celler kan dyrkes på denne måde, hvilket gør det muligt for forskere at skabe komplekse vævsmodeller, der ligner nyrens oprindelige struktur. Det gør det lettere at studere cellulær adfærd, interaktioner og reaktioner i en mere fysiologisk relevant kontekst.
NRK-cellelinjen er en værdifuld ressource i biologisk forskning, især inden for kræft og nyrefysiologi. Disse epitelceller, der stammer fra nyrerne hos en gennemsnitlig rotte, giver forskerne mulighed for at dykke ned i nyrernes komplicerede funktion og studere kræftceller i et kontrolleret laboratoriemiljø. Med deres anvendelighed i 3D-cellekultur gør NRK-celler det muligt at skabe realistiske vævsmodeller til omfattende undersøgelser af cellulær adfærd og respons.

Væv	Nyre

Synonymer

- Normal Rat Kidney

KLASSIFICERING

Organisme	Rotte
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Epitelial

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

NRK (Cytion-katalognummer 305195)

NCBI-skattenummer	10116
Cellosaurus	CVCL_3758

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

DMEM, w: 4,5 g/L glukose, w: 4 mM L-glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM natriumpyruvat (Cytion artikelnummer 820300a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Race / underart	Osborne-Mendel
Donorens alder	Voksen

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB