UMR-106

305197

GENEL BILGILER

Açıklama

UMR-106, kemik metabolizması, kanser biyolojisi ve osteoblast farklılaşmasını araştıran çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bir sıçan modelinden türetilmiş bir osteosarkom hücre hattıdır. Bu hücreler paratiroid hormonuna (PTH), prostaglandinlere ve kemik emici steroidlere karşı oldukça duyarlıdır, bu da onları kemik hücrelerinin düzenleyici mekanizmaları üzerine yapılan araştırmalar için değerli kılar. UMR-106 hücrelerinin PTH duyarlılığı, ilgili hücre hattı UMR-108'inkinden önemli ölçüde daha fazladır ve PTH sinyal yollarına odaklanan çalışmalarda benzersiz faydalarını vurgulamaktadır. UMR-106 hücreleri ayrıca osteoblast araştırmalarında kritik belirteçler olan alkalin fosfataz, osteokalsin ve kemikle ilgili diğer proteinlerin üretimini de sergiler.
Kanser araştırmalarında, UMR-106 hücreleri osteosarkom gelişimi ve ilerlemesinin altında yatan moleküler mekanizmaları incelemek için bir model görevi görür. Hızlı çoğalma ve in vivo tümör oluşturma yeteneği gibi kanser hücrelerinin tipik özelliklerini sergilerler ve araştırmacıların osteosarkomla ilişkili genetik ve epigenetik değişiklikleri keşfetmelerine olanak tanırlar. Bu hücreler aynı zamanda yeni anti-kanser ilaçlarının etkinliğini ve güvenliğini test etmek için klinik öncesi çalışmalarda da etkili olup, terapötik ajanların ön değerlendirmesi için güvenilir bir sistem sağlar.
Ayrıca, UMR-106 hücreleri osteoblast fonksiyonu ve farklılaşmasında rol oynayan yolları araştırmak için kullanılmaktadır. Araştırmacılar, UMR-106 hücrelerinde protein kinaz C aktivasyonunun, hücre içi kalsiyum seviyelerinde ATP kaynaklı artışları engellediğini ve osteoblast aktivitesini yöneten karmaşık düzenleyici ağlar hakkında bilgi sağladığını gözlemlemişlerdir. Bu hücrelerin çeşitli uyaranlara karşı duyarlılığı ve kilit osteoblastik belirteçleri üretme yetenekleri, UMR-106'yı kemik biyolojisi çalışmalarında ve kemikle ilgili bozuklukları tedavi etmek için stratejiler geliştirmede kritik bir araç haline getirmektedir.

Doku	Kemik
Hastalık	Sıçan osteosarkomu

Eş anlamlılar

- UMR 106
- UMR106

SINIFLANDIRMA

Canlı	Sıçan
Büyüme özellikleri	Bağlı
Biyogüvenlik seviyesi	1

ÖZELLIKLER

Morfoloji	Epitelyal

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

UMR-106 (Cytion katalog numarası 305197)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	10116
Cellosaurus	CVCL_3617

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

İFADE VE DUYARLILIK

Eksprese edilen reseptörler

Paratiroid hormonu (PTH), 1-25(OH)2D3 (kemik emici steroid hormon)

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

DMEM, w: 4,5 g/L Glukoz, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM Sodyum piruvat (Cytion ürün numarası 820300a)

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %10 FBS ile takviye edin

Ayrıştırma reaktifi	Accutase

Alt kültür oluşturma

Yapışık hücrelerden eski ortamı çıkarın ve kalsiyum ve magnezyum içermeyen PBS ile yıkayın. T25 şişeleri için 3-5 ml PBS ve T75 şişeleri için 5-10 ml kullanın. Ardından, T25 flasklar için 1-2 ml ve T75 flasklar için 2,5 ml kullanarak hücreleri Accutase ile tamamen kaplayın. Hücreleri ayırmak için oda sıcaklığında 8-10 dakika inkübasyona bırakın. İnkübasyondan sonra, hücreleri yeniden süspanse etmek için 10 ml besiyeriyle hafifçe karıştırın, ardından 300xg'de 3 dakika santrifüjleyin. Süpernatantı atın, hücreleri taze besiyerinde yeniden süspanse edin ve zaten taze besiyeri içeren yeni şişelere aktarın.

Sıvı değişimi	haftada 2 ila 3 kez

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

BAĞIŞÇI

Tür / alt tür	Sprague Dawley
Bağışçının yaşı	Yetişkin

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir	Yes