RWPE-1

305217

GENERAL INFORMATION

Description

שמקורו באפיתל הערמונית של גבר לבן בן 54 ללא עדות לסרטן הערמונית, הוא משאב יקר ערך במחקר ביו-רפואי, במיוחד במחקרים RWPE-1, קו התאים על ביולוגיה של הערמונית וסרטן. תאים אפיתל אלה, המאופיינים בתכונות צמיחה הדבקות ובמורפולוגיה אפיתלית טיפוסית, הונצחו באמצעות רטרו-וירוס המנטרל את חלבון הרטינובלסטומה ומקדם הנצחת תאים (HPV-18), מנגיף הפפילומה האנושי E7 18 חסר שכפול הנושא את הגן.
תאי RWPE-1, שמקורם בערמונית אנושית תקינה, משמשים במחקר על סרטן הערמונית, אף על פי שהביטוי של קולטני האנדרוגן בהם הוא צנוע יחסית, מבטא ציטוקרטין 8 ו-18, המאשרים את השושלת האפיתלית שלהם. RWPE-1 במיוחד בהשוואה לקווי תאים שמקורם בסרטן הערמונית. קו התאים האפיתל המשקפים את אופייהם הלא-סרטני, הביטוי של סמנים ספציפיים לערמונית כגון pRB-ו p53 אכן מבטאים מדכאי גידולים כגון RWPE-1 בעוד שתאי Kallikrein 3 (KLK3) או PSA הוא בדרך כלל נמוך או נעדר בתנאי תרבית סטנדרטיים.
אנושיים יכולים להתארגן במבנים אצינריים המזכירים את המבנה הנורמלי של RWPE-1 תאי Matrigel-בתרבויות תלת-ממדיות, כגון אלה שנוצרו ב מראים תגובה פחות בולטת בהשוואה לקווי תאים RWPE-1 בתגובה לגירוי אנדרוגני, תאי (אנטיגן ספציפי לערמונית) PSA הערמונית. בכל הנוגע להפרשת מהווים מודל חשוב להבנת המאפיינים הבסיסיים של תאי אפיתל ערמונית נורמליים RWPE-1 של סרטן הערמונית. לכן, בעוד שתאי.
משמש מודל לחקר המעבר לשינוי ממאיר והדינמיקה של תאי סרטן, כולל תאי סרטן הערמונית הגרורתיים RWPE-1 אופיים הלא-ממאיר של תאי והורמון גדילה בתנאי התרבית יכולה להבהיר עוד יותר את המסלולים המעורבים בהיפרפלזיה של EGF וקרצינוגנזה של הערמונית. הכללת גורמים כמו מאפשרים הבנה מקיפה של סרטן הערמונית, מהתחלתו בקווי תאים של הערמונית RWPE-1 הערמונית ובהתקדמות לכיוון סרטן הערמונית. לסיכום, תאי ועד להתבטאותו בחולי סרטן הערמונית.

Tissue	ערמונית

Synonyms

- RWPE1

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	אפיתל
Cell type	תא אפיתל של הערמונית

Karyotype

לתאי RWPE-1 45 יש פלואידיות כרומוזומלית דיפלואידית, והם מציגים וריאציות כרומוזומליות כגון X,-Y, 51-ו, XY.

IDENTIFIERS

Citation

RWPE-1 (מספר קטלוגי Cytion 305217)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_3791

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

(אנו לא מספקים מוצר זה; אנא פנה לספקים אחרים. אנא הודע לנו אם אתה זקוק לעזרה נוספת) K-SFM

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

ל-10 מ"ל, ולאחר סינון סטריל, הוסף תערובת זו BPE ו-EGF אין לסנן את התמיסה במלואה. הוסף EGF. נ"ג/מ"ל 5 BPE, הוסף לתמיסה 0.05 מ"ג/מ"ל לתמיסה.

Dissociation reagent	אקוטאז

Subculturing

T75, ועבור בקבוקי PBS, השתמש ב-3-5 מ"ל T25, ללא סידן ומגנזיום. עבור בקבוקי PBS-הסר את המדיום הישן מהתאים הדבוקים ושטוף אותם ב השאר את .T75 ו-2.5 מ"ל עבור בקבוקי T25 תוך שימוש ב-1-2 מ"ל עבור בקבוקי Accutase-השתמש ב-5-10 מ"ל. לאחר מכן, כסה את התאים לחלוטין ב התאים לדגירה בטמפרטורת החדר למשך 8-10 דקות כדי לנתק אותם. לאחר הדגירה, ערבב בעדינות את התאים עם 10 מ"ל של מדיום כדי להחזיר אותם למשך 3 דקות. השלך את הנוזל העליון, החזר את התאים לתמיסה במדיום טרי והעבר אותם לצלחות חדשות xgלתמיסה, ואז סובב בצנטריפוגה ב-300 שכבר מכילות מדיום טרי.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו- (Cytion 800100 מספר קטלוגי) CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך -Cשורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78°. ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Donor age	54 שנים
Ethnicity	קווקזי

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">הצהרת האחריות שלנו

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB