NCI-H441

305219

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apraksts

NCI-H441 šūnu līnija, pazīstama arī kā H441, izveidota 1982. gadā no pleiras izsvīduma vīrieša pacientam ar papilāro adenokarcinomu plaušās, ir labi raksturota epitēlija adenokarcinomas šūnu līnija. Šīs šūnas tiek plaši izmantotas bioloģiskajos pētījumos to nozīmīguma dēļ plaušu epitēlija bioloģijā, padarot tās par kritisku in vitro modeli pētījumiem par transepitelio transportu un epitēlija barjeras funkciju.
NCI-H441 šūnu līnija ir būtisks instruments, lai padziļinātu mūsu izpratni par plaušu zāļu izplatību un audzēju kinētiku. Tās izmantošana 3D šūnu kultūras modeļos ļauj detalizēti pētīt, kā zāles tiek absorbētas, izplatītas, metabolizētas un izdalītas plaušu vidē, cieši imitējot in vivo apstākļus.
Ņemot vērā to izcelsmi un īpašības, NCI-H441 šūnas ir īpaši vērtīgas pētījumos, kas vērsti uz distālajām plaušām un saistītām slimībām, tostarp plaušu adenokarcinomu, kalpojot kā stabils un atbilstošs šūnu modelis plaušu slimību mehānismu izpratnei un potenciālo terapeitisko intervenču novērtēšanai.
NCI-H441 šūnas ir nozīmīgas 3D šūnu kultūrā, augstas caurlaidspējas skrīningā un toksikoloģijas pētījumos, sniedzot vērtīgus datus par šūnu reakcijām un terapeitisko līdzekļu efektivitāti. Cilvēka šūnu līnijas H441 ievērojama pielietojuma joma ir to izmantošana kā transfekcijas saimnieks plaušu virsmas aktīvās vielas proteīna (SP-B) ekspresijai, izmantojot ugunskrēsliņas-Luc reporteru sistēmu, kas uzsver to nozīmi inhalācijas biofarmācijas un transepitelālā transporta pētījumos. Šī spēja, kopā ar to ekspresiju mRNA un proteīna galvenajam virsmas aktīvās vielas apoproteīnam (SP-A), uzsver šīs šūnu līnijas nozīmi plaušu funkciju un traucējumu izpētē, īpaši tiem, kas ietekmē virsmas aktīvās vielas regulāciju un sintēzi.

Audums	Plaušas
Slimība	Papilārā adenokarcinoma
Metastāžu vieta	Perikarda izsvīdums

Sinonīmi

- H441
- H-441
- NCI-H441-4
- NCI-441
- NCIH441

KLASIFIKĀCIJA

Organisms	Cilvēks
Sekss	Vīrietis
Augšanas īpašības	Atbalstītājs
Bioloģiskās drošības līmenis	1

RAKSTURLIELUMI

Šūnu tips	Kluba šūna

Kariotips

NCI-H441 šūnu līnijai ir hiperdiploīdais kariotips, ar 52 hromosomu skaitu, lai gan ir dokumentētas variācijas no 44 līdz 59 hromosomām.

Laiks, kas nepieciešams, lai skaits dubultojās	58 stundas

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKATORI

Atsauce

NCI-H441 (Cytion kataloga numurs 305219)

NCBI nodokļu identifikācijas numurs	9606
Cellosaurus	CVCL_1561

APSTRĀDE UN AUDZĒŠANA

Barotne

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabils glutamīns, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion izstrādājuma numurs 820700a)

Inkubācijas vide	37°C, 5%CO2, mitrināta atmosfēra.

Papildinājumi

Papildināt barotni ar 10% FBS

Disociācijas reaģents	Accutase

Pārstādīšana

Noņemt veco barotni no pielipušajām šūnām un mazgāt tās ar PBS, kurā nav kalcija un magnija. T25 kolbām izmantojiet 3-5 ml PBS, bet T75 kolbām - 5-10 ml. Pēc tam pilnībā pārklājiet šūnas ar Accutase, izmantojot 1-2 ml T25 kolbām un 2,5 ml T75 kolbām. Ļaujiet šūnām inkubēties istabas temperatūrā 8-10 minūtes, lai tās atdalītos. Pēc inkubācijas uzmanīgi samaisiet šūnas ar 10 ml barotnes, lai tās atkārtoti suspendētu, pēc tam centrifugējiet 3 minūtes ar 300xg. Izmetiet supernatantu, atkārtoti suspendējiet šūnas svaigā barotnē un pārvietojiet tās jaunās kolbās, kurās jau ir svaiga barotne.

Šķidruma atjaunošana	2 līdz 3 reizes nedēļā

Atkausēšana un kultivēšana

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITĀTES KONTROLE UN KRIOKONSERVĀCIJA

Sterilitāte

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.
Lai pārliecinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.

Saldēšanas barotne	Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanos un samazinātu krioinducēto stresu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpeklī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starpposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Piegādes nosacījumi

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidruma daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

ZIEDOTĀJS

Donora vecums	33 gadi
Etniskā piederība	Eiropas

JURIDISKIE JAUTĀJUMI UN DROŠĪBA

Drošības pasākumi

Plānojot uzglabāt kriokviālu šķidrā slāpeklī turpmākai atkausēšanai, obligāti jāievēro stingri drošības pasākumi. Ir nepieciešami piemēroti aizsargcimdi un apģērbs, un, pārvietojot sasaldētos paraugus uz šķidrā slāpekļa tvertni vai no tās, ir jālieto sejas maska vai aizsargbrilles. Tas jādara, lai mazinātu traumu risku, ko var radīt iespējamas kriokrioviālu eksplozijas, kas var izraisīt asu fragmentu izmešanu.

Garantija

Uzņēmumā Cytion mēs atbalstām savu produktu kvalitāti un dzīvotspēju.
Mēs garantējam, ka mūsu šūnas būs dzīvotspējīgas kultivēšanas sākumā 60 dienas pēc nosūtīšanas no mūsu ražotnēm.
Mēs nodrošinām, ka visi materiāli atbilst analīzes sertifikātā un/vai produkta lapā aprakstītajām specifikācijām
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu <a href=""/"/Kas mēs esam/garantija/"" hreflang=""x-default"">Garantijas paziņojumu

Nepieciešams materiālu nodošanas līgums	Yes

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Sastāva tabula