LNCaP clone FGC

305220

GENERAL INFORMATION

Description

El clon FGC (colonias de crecimiento rápido) de LNCaP es una línea celular epitelial que se ha convertido en un pilar fundamental en el campo de la investigación del cáncer, especialmente en estudios relacionados con el cáncer de próstata. La línea celular madre LNCaP se estableció a partir de un carcinoma metastásico de próstata en un paciente caucásico de 50 años, a partir de una biopsia por aspiración con aguja del ganglio linfático supraclavicular izquierdo. Estas células de carcinoma de próstata humano muestran notables propiedades tumorigénicas en agar blando y en ratones desnudos, lo que subraya su relevancia en el estudio de los aspectos invasivos y metastásicos del cáncer.
El clon FGC de LNCaP se caracteriza por su patrón de crecimiento adherente, que a menudo forma células individuales y agrupaciones poco compactas, su tasa de crecimiento lenta y una propensión a acidificar rápidamente el medio de cultivo. Una característica definitoria del clon FGC de LNCaP es su expresión de marcadores clave del cáncer de próstata, como la fosfatasa ácida prostática humana y el antígeno prostático específico (PSA), junto con una fuerte sensibilidad a los andrógenos. Esta sensibilidad a los andrógenos y la participación del eje del receptor de andrógenos en la regulación de la proliferación hacen que la línea celular de cáncer de próstata LNCaP, clon FGC, sea un modelo in vitro invaluable para el estudio de la sensibilidad a los andrógenos y sus implicaciones en la carcinogénesis prostática.
En resumen, la línea celular de cáncer de próstata humano LNCaP clon FGC, con sus características únicas y su amplia utilidad en aplicaciones avanzadas de investigación del cáncer, incluyendo el cultivo celular en 3D y los estudios de transfección, sigue siendo muy citada y valorada en el campo de la investigación con células humanas, proporcionando conocimientos profundos sobre los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al cáncer de próstata y ofreciendo vías para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

Tissue	Próstata
Disease	Carcinoma
Metastatic site	Ganglio linfático supraclavicular izquierdo

Synonyms

- LNCaP-Clone-FGC
- LNCaP.FGC
- LNCaP-FGC
- LNCaP FGC
- LNCAPCLONEFGC
- LNCaP-ATCC

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Epithelial

Karyotype

Presenta un cariotipo hipotetraploide con un número modal de cromosomas de 84

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Doubling time	34-43 horas

IDENTIFIERS

Citation

Clon FGC de LNCaP (número de catálogo de Cytion 305220)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1379

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, con 2,0 mM de glutamina estable y 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artículo de Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmósfera humidificada.

Supplements

Añade al medio un 10 % de FBS

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Retira el medio usado de las células adheridas y lávalas con PBS sin calcio ni magnesio. Para los frascos T25, usa de 3 a 5 ml de PBS, y para los frascos T75, usa de 5 a 10 ml. Luego, cubra las células por completo con Accutase, utilizando de 1 a 2 ml para los frascos T25 y 2,5 ml para los frascos T75. Deje que las células se incuben a temperatura ambiente durante 8 a 10 minutos para desprenderse. Después de la incubación, mezcla suavemente las células con 10 ml de medio para resuspendarlas; luego, centrifuga a 300xg durante 3 minutos. Deseche el sobrenadante, resuspenda las células en medio fresco y transfiéralas a frascos nuevos que ya contengan medio fresco.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

Se descarta la contaminación por micoplasmas mediante ensayos basados en PCR y métodos de detección de micoplasmas basados en luminiscencia.
Para garantizar que no haya contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Freeze medium	Como medio de criopreservación, utilizamos un medio de crecimiento completo (que incluye FBS) + 10 % de DMSO para garantizar una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo de Cytion 800100), que incluye osmoprotectores y estabilizadores metabólicos optimizados para mejorar la recuperación y reducir el estrés inducido por la criopreservación.

Storage conditions

Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase de vapor a una temperatura de entre −150 y −196 °C, aproximadamente. El almacenamiento a −80 °C solo es aceptable como un paso intermedio breve antes de transferirlos al nitrógeno líquido.

Shipping conditions

Las líneas celulares criopreservadas se envían en hielo seco, en un embalaje aislante validado que contiene suficiente refrigerante para mantener una temperatura de aproximadamente −78 °C durante todo el transporte. Al recibir el envío, revise el contenedor de inmediato y traslade los viales sin demora al lugar de almacenamiento adecuado.

DONOR

Donor age	50 años
Ethnicity	Europeo

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su descongelación futura, es obligatorio cumplir con estrictas medidas de seguridad. Es esencial contar con guantes y ropa de protección adecuados, y se requiere el uso de una mascarilla o lentes de seguridad durante la transferencia de muestras congeladas hacia o desde el tanque de nitrógeno líquido. Esto tiene como objetivo mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones de los criotubos al retirarlos, lo que puede provocar la proyección de fragmentos afilados.

Warranty

En Cytion, respaldamos la calidad y la viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante
60 días a partir de la fecha de envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales cumplen con las especificaciones descritas en el
Certificado de Análisis y/o la Ficha del Producto.
Para obtener más detalles, consulte nuestra
Declaración de garantía.

Material Transfer Agreement required	Yes

PRODUCT DETAILS

Composition table