Clone FGC da linha LNCaP

305220

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

O clone LNCaP FGC (Fast Growing Colonies) é uma linha de células epiteliais que se tornou uma pedra angular no campo da investigação do cancro, especialmente em estudos relacionados com o cancro da próstata. A linha de células LNCaP foi estabelecida a partir de um carcinoma metastático da próstata de um paciente caucasiano de 50 anos de idade, proveniente de uma biópsia por aspiração com agulha do nódulo linfático supraclavicular esquerdo. Estas células de carcinoma da próstata humana demonstram propriedades tumorigénicas notáveis em ágar mole e em ratinhos nus, sublinhando a sua relevância no estudo dos aspectos invasivos e metastáticos do cancro.
O clone FGC do LNCaP caracteriza-se pelo seu padrão de crescimento aderente, formando frequentemente células únicas e aglomerados frouxamente ligados, pela sua taxa de crescimento lenta e por uma propensão para acidificar rapidamente o meio de cultura. Uma caraterística que define o clone FGC LNCaP é a sua expressão de marcadores-chave do cancro da próstata, como a fosfatase ácida prostática humana e o antigénio específico da próstata (PSA), com uma forte sensibilidade aos androgénios. Esta sensibilidade aos androgénios e o envolvimento do eixo dos receptores de androgénios na regulação da proliferação fazem da linha celular de cancro da próstata LNCaP clone FGC um modelo inestimável in vitro para o estudo da sensibilidade aos androgénios e das suas implicações na carcinogénese da próstata.
Em suma, a linha celular de cancro da próstata humano LNCaP clone FGC, com as suas caraterísticas únicas e extensa utilidade em aplicações avançadas de investigação do cancro, incluindo cultura de células 3D e estudos de transfecção, continua a ser altamente citada e valorizada no campo da investigação de células humanas, fornecendo uma visão profunda dos mecanismos moleculares e celulares subjacentes ao cancro da próstata e oferecendo vias para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas.

Tecido	Próstata
Doença	Carcinoma
Local da metástase	Linfonodo supraclavicular esquerdo

Sinónimos

- LNCaP-Clone-FGC
- LNCaP.FGC
- LNCaP-FGC
- LNCaP FGC
- LNCAPCLONEFGC
- LNCaP-ATCC

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Masculino
Propriedades de crescimento	Aderente
Nível de biossegurança	1

CARACTERÍSTICAS

Morfologia	Epitelial

Cariótipo

Apresenta um cariótipo hipotetraplóide com um número cromossómico modal de 84

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tempo de duplicação	34-43 horas

IDENTIFICADORES

Referência

LNCaP clone FGC (número de catálogo Cytion 305220)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1379

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

RPMI 1640, com: 2,0 mM de glutamina estável, com: 2,0 g/L NaHCO3 (número de artigo Cytion 820700a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS

Reagente de dissociação	Accutase

Subcultura

Retirar o meio antigo das células aderentes e lavá-las com PBS sem cálcio e magnésio. Nos frascos T25, utilizar 3-5 ml de PBS e nos frascos T75, 5-10 ml. Em seguida, cobrir completamente as células com Accutase, utilizando 1-2 ml para os frascos T25 e 2,5 ml para os frascos T75. Deixar as células incubar à temperatura ambiente durante 8-10 minutos para as destacar. Após a incubação, misturar suavemente as células com 10 ml de meio para as ressuspender e, em seguida, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Deitar fora o sobrenadante, ressuspender as células em meio fresco e transferi-las para novos frascos que já contenham meio fresco.

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	50 anos
Etnia	Europeu

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes

DETALHES DO PRODUTO

Tabela de composição