BJ

305222

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Sel BJ, yang berasal dari kulup laki-laki neonatal, adalah fibroblas manusia, yang merupakan jenis sel yang ditemukan dalam jaringan ikat. Sel ini sering digunakan dalam penelitian biologi dan medis karena kemampuannya untuk berkembang biak dan asalnya dari manusia, sehingga relevan untuk mempelajari biologi dan penyakit manusia.
Sel BJ, yang berasal dari fibroblas kulit manusia, terutama digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan respons seluler terhadap stres oksidatif, yang berkontribusi pada pemahaman kita tentang penuaan, mekanisme penyakit, dan pertahanan seluler terhadap kerusakan oksidatif. Sel-sel ini selanjutnya menghadirkan alternatif yang layak untuk sel BALB/c 3T3 tikus untuk evaluasi toksikologi in vitro, khususnya dalam uji Neutral Red Uptake (NRU). Uji ini banyak digunakan untuk menilai efek sitotoksik dengan mengukur viabilitas sel melalui penyerapan pewarna merah netral.
Tidak adanya aktivitas telomerase yang kuat pada fibroblas kulup manusia BJ, terlepas dari hTERT, menyoroti peran mereka dalam mempelajari penuaan dini, pemanjangan telomer, dan efek hiperoksia pada panjang telomer. Garis sel manusia BJ dan HaCaT sering digunakan bersama dalam penelitian dermatologis karena sifatnya yang saling melengkapi dalam mewakili aspek-aspek utama fisiologi kulit. Sel HaCaT, yang merupakan keratinosit manusia, berfungsi sebagai model untuk lapisan epidermis kulit, sedangkan sel BJ, yang berasal dari fibroblas manusia, mewakili lapisan kulit. Kombinasi ini memungkinkan studi komprehensif tentang respons kulit pada tingkat epidermis dan dermis, menjadikannya sangat berharga untuk menyelidiki penuaan kulit, penyembuhan luka, dan efek berbagai perawatan pada kesehatan kulit.
Singkatnya, sel BJ, juga dikenal sebagai fibroblas BJ manusia, berfungsi sebagai model serbaguna dalam penelitian biologi, menawarkan wawasan tentang dampak paparan lingkungan, penuaan sel, dan biologi radikal.

Tisu	Kulup

Sinonim

- FF-WT-BJ
- BJ1

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Laki-laki
Sifat-sifat pertumbuhan	Pengikut
Tingkat keamanan hayati	1

KARAKTERISTIK

Morfologi	Fibroblast
Jenis sel	Fibroblast kulup

Kariotipe

Sel-sel BJ mempertahankan kariotipe diploid yang normal. Namun, di luar penggandaan populasi tertentu, kariotipe abnormal yang mengindikasikan perubahan genetik dapat muncul.

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

BJ (nomor katalog Cytion 305222)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_3653

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

DMEM, w: 4,5 g/L Glukosa, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM Natrium piruvat (Nomor artikel Cytion 820300a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Tambahkan media dengan 10% FBS, 20 ng/mL bFGF

Reagen disosiasi	Accutase

Perbanyakan sel

Buang media lama dari sel yang melekat dan cuci dengan PBS yang tidak mengandung kalsium dan magnesium. Untuk labu T25, gunakan 3-5 ml PBS, dan untuk labu T75, gunakan 5-10 ml. Kemudian, tutupi sel sepenuhnya dengan Accutase, menggunakan 1-2 ml untuk labu T25 dan 2,5 ml untuk labu T75. Biarkan sel diinkubasi pada suhu kamar selama 8-10 menit untuk melepaskannya. Setelah inkubasi, campurkan sel secara perlahan dengan 10 ml medium untuk meresuspensi sel, kemudian sentrifugasi pada 300xg selama 3 menit. Buang supernatan, resuspensi sel dalam medium segar, dan pindahkan ke dalam labu baru yang sudah berisi medium segar.

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	Kurang dari 1 bulan
Etnis	Kaukasia

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes

DETAIL PRODUK

Tabel komposisi