Ba/F$_3$

305224

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Garis sel BA/F3, yang berasal dari sel pro-B murine dari strain tikus BALB/c, merupakan landasan dalam penemuan dan pengembangan obat, di mana sel BaF3 biasanya digunakan untuk menguji kemanjuran inhibitor molekul kecil yang menargetkan kinase onkogenik.
Baf3 adalah garis sel yang bergantung pada IL-3 dengan morfologi sel bulat tunggal dan contoh polimorfisme. Sel Ba / F3 digunakan untuk uji transformasi F3 dan uji proliferasi Ba / F3. Uji transformasi F3 memungkinkan eksplorasi bagaimana perubahan genetik spesifik dapat memberikan pertumbuhan independen IL-3, yang mengindikasikan potensi onkogenik. Sel-sel ini bergantung pada pensinyalan sitokin melalui reseptor sitokin untuk IL-3 untuk mempertahankan proliferasi mereka, menjadikan uji proliferasi baf3 sebagai alat yang sangat baik untuk mempelajari efek kekurangan sitokin dan peran pensinyalan sitokin dalam kelangsungan hidup dan pertumbuhan sel.
Sel BA / F3 telah terbukti sangat berharga dalam konteks evaluasi onkogen kinase dan pengujian inhibitor kinase molekul kecil. Sebagai contoh, sel Ba/F3 yang ditransformasikan untuk mengekspresikan onkogen BCR-ABL, yang merupakan karakteristik leukemia myeloid kronis (CML), telah digunakan untuk menguji efektivitas penghambat tirosin kinase (TKI) seperti imatinib. Sel BA/F3 juga cocok untuk skrining throughput tinggi dan eksplorasi mekanisme resistensi obat, yang sangat penting dalam memahami dinamika mutasi kinome terkait kanker dan mengembangkan strategi untuk mengatasi resistensi dalam terapi yang ditargetkan.
Secara keseluruhan, garis sel BA / F3, dengan fitur dan fungsi biologisnya yang berbeda, berfungsi sebagai sumber daya penting dalam penemuan obat kinase.

Tisu	Sumsum tulang

Sinonim

- BA/F3
- BaF3
- BAF3
- Baf3

KLASIFIKASI

Organisme	Tikus
Sifat-sifat pertumbuhan	Penangguhan
Tingkat keamanan hayati	1

KARAKTERISTIK

Morfologi	Limfosit
Jenis sel	Sel Pro-B

Kariotipe

Garis sel Ba/F3 menunjukkan kariotipe murine yang hampir diploid, dengan sekitar 33% sel menunjukkan poliploidi.

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

Ba/F3 (Nomor katalog Cytion 305224)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	10090
Cellosaurus	CVCL_0161

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

RPMI 1640, w: 2,0 mM Glutamin stabil, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Nomor artikel Cytion 820700a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Tambahkan media dengan 5% FBS yang dinonaktifkan dengan panas, 10 ng/mL IL-3 tikus

Perbanyakan sel

Pertahankan kultur dengan secara berkala menambahkan atau mengganti medium. Mulailah kultur dengan kepadatan 5 x 10^5 sel/ml dan jaga konsentrasi sel dalam rentang 3 x 10^5 hingga 1 x 10^6 sel/ml untuk pertumbuhan optimal.

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Jenis / subspesies	C3H

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes

DETAIL PRODUK

Tabel komposisi