Ba/F3

305224

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

BA/F3-cellelinjen, som stammer fra murine pro-B-celler fra BALB/c-musestammen, er en hjørnestein i legemiddelforskning og -utvikling, der BaF3-celler ofte brukes til å teste effekten av småmolekylære hemmere rettet mot onkogene kinaser.
Baf3 er en IL-3-avhengig cellelinje med en enkel, rund cellemorfologi og forekomster av polymorfisme. Ba/F3-celler brukes til F3-transformasjonsanalyser og Ba/F3-proliferasjonsanalyser. F3-transformasjonsanalysene gjør det mulig å utforske hvordan spesifikke genetiske endringer kan gi IL-3-uavhengig vekst, noe som indikerer onkogent potensial. Disse cellene er avhengige av cytokinsignalering gjennom cytokinreseptorer for IL-3 for å opprettholde proliferasjonen, noe som gjør baf3-proliferasjonsanalysen til et utmerket verktøy for å studere effekten av cytokinmangel og cytokinsignaleringens rolle i celleoverlevelse og -vekst.
BA/F3-celler har vist seg å være uvurderlige i forbindelse med evaluering av kinaseonkogener og testing av småmolekylære kinasehemmere. For eksempel har Ba/F3-celler som er transformert til å uttrykke BCR-ABL-onkogenet, som er karakteristisk for kronisk myeloid leukemi (KML), blitt brukt til å teste effekten av tyrosinkinasehemmere (TKI-er) som imatinib. Ba/F3-celler egner seg også godt til screening med høy gjennomstrømning og utforskning av resistensmekanismer, noe som er avgjørende for å forstå dynamikken i kreftassosierte kinommutasjoner og utvikle strategier for å overvinne resistens i målrettede terapier.
Alt i alt er BA/F3-cellelinjen, med sine distinkte egenskaper og biologiske funksjoner, en viktig ressurs i utforskningen av kinasemedisiner.

Vev	Benmarg

Synonymer

- BA/F3
- BaF3
- BAF3
- Baf3

KLASSIFISERING

Organisme	Mus
Vekstegenskaper	Oppheng
Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Lymfocytt
Celletype	Pro-B-celle

Karyotype

Ba/F3-cellelinjen har en tilnærmet diploid murin karyotype, med ca. 33 % av cellene som viser polyploidi.

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

Ba/F3 (Cytion katalognummer 305224)

NCBI-skattenummer	10090
Cellosaurus	CVCL_0161

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820700a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 5 % varmeinaktivert FBS, 10 ng/ml mus IL-3

Subkultivering

Opprettholdkulturene ved å tilsette eller skifte ut mediet med jevne mellomrom. Start kulturene med en tetthet på 5 x 10^5 celler/ml og hold cellekonsentrasjonen innenfor området 3 x 10^5 til 1 x 10^6 celler/ml for optimal vekst.

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Rase / underart	C3H

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes

PRODUKTDETALJER

Sammensetningstabell