MB49

305240

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apraksts

MB49 šūnu līnija ir peļu modelis, kas iegūts no C57BL/6 peļu urīnpūšļa epitēlija šūnām. Tā sākotnēji tika izstrādāta urīnpūšļa vēža izpētei, nodrošinot platformu urīnpūšļa karcinomas bioloģisko un molekulāro īpašību izpētei. Šūnu līniju izveidoja, ķīmiski inducējot urīnpūšļa audzējus, izmantojot kancerogēnu 7,12-dimetilbenz[a]antracēnu (DMBA), kā sīki aprakstīts agrīnos pētījumos. MB49 šūnām piemīt audzēja fenotips, ja tās transplantē singēniskām pelēm, veidojot uroteliālas karcinomas. Šie audzēji bieži vien ir vāji diferencēti, un tiem var būt jaukta morfoloģija, tostarp vārpstas formas šūnas un adenokarcinomatozas zonas, kas atgādina agresīvus urīnpūšļa vēža apakštipus, kas novēroti cilvēka patoloģijā.
Turpmāku pētījumu rezultātā tika izstrādāta MB49-I, kas ir invazīvāka MB49 apakšlīnija. Šī apakšlīnija tika izveidota pēc 13 secīgām in vivo pasāžām, palielinot tās invazīvo un metastātisko potenciālu. MB49-I šūnām ir paaugstināta proteolītiskā aktivitāte, jo īpaši tādiem fermentiem kā kacepsīns B, matriksa metaloproteināze 9 (MMP-9) un urokināzes tipa plazminogēna aktivators (uPA). Šie fermenti veicina āršūnu matriksa komponentu sadalīšanos, veicinot audzēja šūnu invazi un metastāzes. MB49-I apakšlīnija, ortotopiski inokulēta singēnisko peļu urīnpūslī, izraisa ļoti invazīvu urīnpūšļa audzēju veidošanos, padarot to par vērtīgu modeli audzēja progresijas izpētei un pretvēža terapijas līdzekļu testēšanai, lai novērstu invazi un metastāzes.
Šis MB49 modelis, tostarp MB49-I variants, ir noderīgs, lai izprastu urīnpūšļa vēža progresēšanas molekulāros mehānismus un izstrādātu jaunas terapeitiskās stratēģijas. Šis modelis precīzi atdarina cilvēka urīnpūšļa vēzi, jo īpaši attiecībā uz spēju simulēt slimības invazīvās un metastātiskās īpašības, tādējādi nodrošinot stabilu sistēmu preklīniskajiem pētījumiem.

Audums	Urīnpūslis
Slimība	Peles urīnpūšļa pārejas šūnu karcinoma

Sinonīmi

- MB-49

KLASIFIKĀCIJA

Organisms	Pele
Sekss	Vīrietis
Augšanas īpašības	Atbalstītājs
Bioloģiskās drošības līmenis	1

RAKSTURLIELUMI

Morfoloģija	Epitēlija

Kariotips

Ir zaudējis Y hromosomu

IDENTIFIKATORI

Atsauce

MB49 (Cytion kataloga numurs 305240)

NCBI nodokļu identifikācijas numurs	10090
Cellosaurus	CVCL_7076

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

APSTRĀDE UN AUDZĒŠANA

Barotne

DMEM, w: 4,5 g/l glikozes, w: 4 mM L-glutamīna, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM nātrija piruvāta (Cytion izstrādājuma numurs 820300a)

Inkubācijas vide	37°C, 5%CO2, mitrināta atmosfēra.

Papildinājumi

Papildināt barotni ar 10% FBS

Disociācijas reaģents	Accutase

Pārstādīšana

Noņemt veco barotni no pielipušajām šūnām un mazgāt tās ar PBS, kurā nav kalcija un magnija. T25 kolbām izmantojiet 3-5 ml PBS, bet T75 kolbām - 5-10 ml. Pēc tam pilnībā pārklājiet šūnas ar Accutase, izmantojot 1-2 ml T25 kolbām un 2,5 ml T75 kolbām. Ļaujiet šūnām inkubēties istabas temperatūrā 8-10 minūtes, lai tās atdalītos. Pēc inkubācijas uzmanīgi samaisiet šūnas ar 10 ml barotnes, lai tās atkārtoti suspendētu, pēc tam centrifugējiet 3 minūtes ar 300xg. Izmetiet supernatantu, atkārtoti suspendējiet šūnas svaigā barotnē un pārvietojiet tās jaunās kolbās, kurās jau ir svaiga barotne.

Atkausēšana un kultivēšana

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITĀTES KONTROLE UN KRIOKONSERVĀCIJA

Sterilitāte

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.
Lai pārliecinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.

Saldēšanas barotne	Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanos un samazinātu krioinducēto stresu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpeklī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starpposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Piegādes nosacījumi

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidruma daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

ZIEDOTĀJS

Šķirne / pasuga	C57BL/ICRF-a(t)
Donora vecums	Pieaugušo

JURIDISKIE JAUTĀJUMI UN DROŠĪBA

Drošības pasākumi

Plānojot uzglabāt kriokviālu šķidrā slāpeklī turpmākai atkausēšanai, obligāti jāievēro stingri drošības pasākumi. Ir nepieciešami piemēroti aizsargcimdi un apģērbs, un, pārvietojot sasaldētos paraugus uz šķidrā slāpekļa tvertni vai no tās, ir jālieto sejas maska vai aizsargbrilles. Tas jādara, lai mazinātu traumu risku, ko var radīt iespējamas kriokrioviālu eksplozijas, kas var izraisīt asu fragmentu izmešanu.

Garantija

Uzņēmumā Cytion mēs atbalstām savu produktu kvalitāti un dzīvotspēju.
Mēs garantējam, ka mūsu šūnas būs dzīvotspējīgas kultivēšanas sākumā 60 dienas pēc nosūtīšanas no mūsu ražotnēm.
Mēs nodrošinām, ka visi materiāli atbilst analīzes sertifikātā un/vai produkta lapā aprakstītajām specifikācijām
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu <a href=""/"/Kas mēs esam/garantija/"" hreflang=""x-default"">Garantijas paziņojumu

Nepieciešams materiālu nodošanas līgums	Yes

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Sastāva tabula