EOMA

305241

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

Bunková línia EOMA, známa aj ako endotelové bunky EOMA, je odvodená zo spontánne vzniknutého hemangioendoteliómu u myší. Táto bunková línia sa vo veľkej miere používa vo výskume na štúdium angiogenézy, procesu tvorby nových ciev, ktorý je rozhodujúci pri normálnych fyziologických procesoch, ako aj pri patologických stavoch, ako je rakovina, diabetická retinopatia a reumatoidná artritída. Bunky EOMA sú charakteristické svojím endotelovým pôvodom a vykazujú vlastnosti typické pre endotelové bunky vrátane tvorby kapilárnych štruktúr in vitro.
Výskumníci využívajú bunkovú líniu EOMA na skúmanie molekulárnych a bunkových mechanizmov, ktoré sú základom angiogenézy. To zahŕňa štúdie o úlohe rôznych rastových faktorov, signálnych dráh a extracelulárnej matrix pri proliferácii, migrácii a tvorbe endotelových buniek. Bunky EOMA sú obzvlášť cenné pri hodnotení účinkov antiangiogénnych zlúčenín, ktoré sa používajú pri liečbe rakoviny a iných ochorení zahŕňajúcich abnormálny rast krvných ciev. Tieto bunky sa používajú aj pri štúdiách expresie génov a pri vývoji terapeutických stratégií zameraných na angiogenézu.
Okrem výskumu angiogenézy slúžia bunky EOMA ako model na štúdium hemangioendoteliómu, zriedkavého cievneho nádoru, čo umožňuje nahliadnuť do biológie nádoru a identifikovať potenciálne terapeutické ciele. Bunkové línie EOMA, ktoré ponúkajú spoľahlivý a reprodukovateľný systém in vitro, významne prispievajú k pochopeniu biológie ciev a k vývoju liečby ochorení súvisiacich s angiogenézou.

Tkanivo	Krvná cieva
Choroba	Hemangioendotelióm krvnej cievy myši, malígny

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Myš
Sex	Nešpecifikované
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Endotel
Typ bunky	Endotelová bunka
Tumorigenický	Áno, u syngenetických myší

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

EOMA (katalógové číslo Cytion 305241)

Daňové identifikačné číslo NCBI	10090
Cellosaurus	CVCL_3507

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Expresia proteínov

Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE), trombospondín, katepsín L, endostatín, interleukín-6 (interleukín 6, IL-6)

Expresia antigénu

CD31 +, vaskulárny adrenalín +, CD45 (Ly5-T200) +

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

DMEM, w: 4,5 g/l glukózy, w: 4 mM L-glutamínu, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM pyruvátu sodného (číslo výrobku Cytion 820300a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % FBS

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmnožovanie kultúr

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Obnova kvapaliny	2 až 3-krát týždenne

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Plemeno / poddruh	129
Vek darcu	Dospelí

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes