JVM-3

305266

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

JVM-3 er en cellelinje for human B-celle-prolymfocytisk leukemi (B-PLL) som er etablert fra perifert blod fra en 73 år gammel kaukasisk mannlig pasient. Linjen vokser i suspensjon som lymfoblastoide celler, enten enkeltvis eller i løse klumper, og er en mye brukt modell for B-PLL, en sjelden og aggressiv moden B-celle-leukemi. JVM-3 har TP53-mutasjoner (p.Pro1435Leu heterozygot og p.Lys601Asn heterozygot), som inaktiverer tumorsuppressorfunksjonen til p53 og er assosiert med resistens mot kjemoterapi ved B-celle-maligniteter. Linjen dyrkes i 90 % RPMI 1640 + 10 % varmeinaktiverte FBS.
JVM-3 kan brukes i forskning på B-PLL, inkludert studier av biologien til moden B-celle-leukemi, TP53-mutasjonsassosiert medikamentresistens, analyse av BCR-signalveien, evaluering av målrettede terapier (BTK-hemmere, venetoklaks, CD20-rettede antistoffer) og farmakologisk legemiddelscreening for B-celle-maligniteter. Den brukes også i komparative studier av undertyper av B-celle-leukemi og som en xenotransplantasjonsmodell hos immunsvekkede verter.

Vev	Perifert blod
Sykdom	B-celle-prolymfocytisk leukemi
Metastaseområde	Perifert blod (leukemisk)

Søknader

Forskning på prolymfocytisk B-celle-leukemi; biologi ved moden B-celle-leukemi; legemiddelresistens ved TP53-mutasjon; evaluering av BTK-hemmere; følsomhet for venetoklaks; testing av antistoffer rettet mot CD20; screening av legemidler mot B-celle-leukemi

Synonymer

- JVM3

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Oppheng
Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	lymfoblastoidceller som vokser enkeltvis eller i klynger i suspensjon;
Celletype	B-lymfoblast
Fordoblingstid	~30 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

JVM-3 (Cytion-katalognummer 305266)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1320

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Mutasjonsprofil

Mutasjon: p.Pro1435Leu, heterozygot; Mutasjon: p.Lys601Asn, heterozygot

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820700a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % varmeinaktivert FBS

Dissosiasjonsmiddel	Ikke nødvendig (suspensjonskultur)

Subkultivering

Fortynn kulturen til 2–5 × 10^5 celler/ml med ferskt, forvarmet komplett medium hver 2.–3. dag. Tell antall levedyktige celler før passering. Sentrifugering (300×g, 5 min) kan benyttes for å skifte medium ved behov.

Oppdelingsforhold	1 til 3
Såtetthet	3 til 5 × 10^5 celler/ml
Væskefornyelse	Hver 2. til 3. dag

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	73 år
Etnisitet	Kaukasisk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes