SNU-16

305273

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buněčná linie SNU-16 je odvozena ze špatně diferencovaného karcinomu žaludku dospělého člověka. Tato buněčná linie se hojně využívá ve výzkumu rakoviny žaludku a nabízí model pro studium molekulárních a buněčných mechanismů, které se podílejí na vývoji a progresi adenokarcinomu žaludku. Buňky SNU-16 jsou zvláště cenné pro zkoumání genetických změn, signálních transdukčních drah a nádorového mikroprostředí spojeného s touto agresivní formou rakoviny žaludku.
Buňky SNU-16 vykazují epiteliální morfologii a vyznačují se expresí markerů karcinomu žaludku, včetně karcinoembryonálního antigenu (CEA) a různých cytokeratinů. Je o nich známo, že mají amplifikaci genu c-MET a nadměrnou expresi receptoru MET, který hraje významnou roli v růstu, přežívání a metastazování buněk. Vědci používají buňky SNU-16 ke zkoumání úlohy signální dráhy MET u rakoviny žaludku a k hodnocení účinnosti inhibitorů MET a dalších cílených terapií. Kromě toho se buňky SNU-16 využívají při studiích rezistence vůči lékům, vysoce výkonných screeningových testech a předklinickém testování nových chemoterapeutických látek. Význam buněčné linie SNU-16 ve výzkumu rakoviny žaludku podtrhuje její důležitost pro lepší pochopení tohoto onemocnění a pro vývoj účinnějších léčebných strategií pro pacienty s rakovinou žaludku.

Tkáň	Žaludek
Nemoc	Adenokarcinom
Místo metastázy	Ascites

Synonyma

- SNU16
- NCI-SNU-16

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Žena
Růstové vlastnosti	Odpružení
Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Epitelové
Tumorogenní	Ano, v polotuhém prostředí

IDENTIFIKÁTORY

Citace

SNU-16 (katalogové číslo Cytion 305273)

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0076

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESE A NÁCHYLNOST

Povrchové antigeny

Krevní skupina A, Rh+, karcinoembryonální antigen (CEA) a TAG 72

Onkogeny

Myc +, erb-B2 +

Mutační profil

Mutace: Lys1358fs*2 (c.4065_4066insTTGA), heterozygotní; Mutace: MSH6, p.Lys1358fs*2 (c.4065_4066insTTGA), heterozygotní; Mutace: MSH6, p.Lys1358fs*2 (c.4065_4066insTTGA), heterozygotní: TP53, p.Tyr205Phe (c.614A>T), homozygotní

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilní glutamin, w: 2,0 g/l NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 10 % FBS, 25 mM HEPES

Subkultivace

Suspenzní buňky: Odstraňte buňky ze substrátu pipetováním čerstvým médiem. Chcete-li získat jednotlivé buňky, propíchněte suspenzi několikrát jehlou o průměru 22 a dávkujte do nových baněk.

Obnova tekutin	2krát týdně

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	33 let
Etnická příslušnost	Východní Asie

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes

PODROBNOSTI O PRODUKTU

Tabulka složení