# SNU-16

305273

## YLEISTÄ TIETOA

**Kuvaus**

SNU-16-solulinja on peräisin ihmisen aikuisen heikosti erilaistuneesta mahasyöpäsolusta. Tätä solulinjaa käytetään laajalti mahasyövän tutkimuksessa, ja se tarjoaa mallin mahalaukun adenokarsinooman kehittymiseen ja etenemiseen liittyvien molekulaaristen ja solumekanismien tutkimiseen. SNU-16-solut ovat erityisen arvokkaita tähän aggressiiviseen mahasyövän muotoon liittyvien geneettisten muutosten, signaalinvälitysreittien ja kasvaimen mikroympäristön tutkimisessa.
SNU-16-soluilla on epiteelimorfologia, ja niille on ominaista mahalaukun karsinooman merkkiaineiden, kuten karsinoembryonisen antigeenin (CEA) ja eri sytokeratiinien ilmentyminen. Niillä tiedetään olevan c-MET-geenin monistuminen ja MET-reseptorin yliekspressio, jolla on merkittävä rooli solujen kasvussa, eloonjäämisessä ja etäpesäkkeiden muodostumisessa. Tutkijat käyttävät SNU-16-soluja tutkiakseen MET-signalointireitin roolia mahasyövässä ja arvioidakseen MET-inhibiittorien ja muiden kohdennettujen hoitojen tehoa. Lisäksi SNU-16-soluja hyödynnetään lääkeresistenssitutkimuksissa, korkean läpimenon seulontamäärityksissä ja uusien kemoterapeuttisten aineiden prekliinisessä testauksessa. SNU-16-solulinjan merkitys mahasyövän tutkimuksessa korostaa sen merkitystä taudin ymmärtämisen edistämisessä ja tehokkaampien hoitostrategioiden kehittämisessä mahasyöpäpotilaille.

| | |
|---|---|
| **Kudos** | Vatsa |
| **Sairaus** | Adenokarsinooma |
| **Metastaasikohde** | Askites |

**Synonyymit**

- SNU16
- NCI-SNU-16

## LUOKITTELU

| | |
|---|---|
| **Organismi** | Ihminen |
| **Sukupuoli** | Nainen |
| **Kasvuominaisuudet** | Jousitus |
| **Bioturvallisuustaso** | 1 |

## OMINAISUUDET

| | |
|---|---|
| **Morfologia** | Epiteeli |
| **Kasvaimia aiheuttava** | Kyllä, puolikiinteässä väliaineessa |

## TUNNISTEET

**Lähdeviite**

SNU-16 (Cytionin luettelonumero 305273)

| | |
|---|---|
| **NCBI-verotunnus** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_0076 |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

**Pinta-antigeenit**

Veriryhmä A, Rh +, karsinoembryoninen antigeeni (CEA) ja TAG 72

**Onkogeenit**

Myc +, erb-B2 +

**Mutaatioprofiili**

Mutaatio: MSH6, p.Lys1358fs*2 (c.4065_4066insTTGA), heterotsygoottinen; Mutaatio: MSH6, p.Lys1358fs*2 (c.4065_4066insTTGA), heterotsygoottinen: TP53, p.Tyr205Phe (c.614A>T), homotsygoottinen

## KÄSITTELY JA VILJELY

**Viljelyalusta**

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820700a)

| | |
|---|---|
| **Inkubaatioilma** | 37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä. |

**Ravintolisät**

Lisätään elatusaineeseen 10 % FBS, 25 mM HEPES

**Soluviljely**

Suspension solut: Poista solut alustasta pipetoimalla tuoreeseen väliaineeseen. Yksittäisten solujen saamiseksi suspensio ohjataan useita kertoja 22-ulotteisen neulan läpi ja annostellaan uusiin pulloihin.

| | |
|---|---|
| **Nesteen uusiminen** | 2 kertaa viikossa |

**Sulatus ja viljely**

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

**Hedelmättömyys**

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

| | |
|---|---|
| **Jäädytysaine** | Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä. |

**Säilytysolosuhteet**

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

**Toimitusehdot**

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

## LAHJOITTAJA

| | |
|---|---|
| **Luovuttajan ikä** | 33 vuotta |
| **Etnisyys** | Itä-Aasia |

## OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

**Turvallisuusohjeet**

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

**Takuu**

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Takuulausumassa

| | |
|---|---|
| **Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan** | Yes |

## TUOTETIEDOT

**Koostumustaulukko**

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB