SNU-16

305273

GENERAL INFORMATION

Description

נגזר מקרצינומה של הקיבה בדרגת התמיינות נמוכה אצל אדם בוגר. קו תאים זה נמצא בשימוש נרחב במחקר סרטן הקיבה, ומספק SNU-16 קו התאים חשובים במיוחד לחקר SNU-16 מודל לחקר המנגנונים המולקולריים והתאיים המעורבים בהתפתחות ובהתקדמות של אדנוקרצינומה של הקיבה. תאי שינויים גנטיים, מסלולי העברת אותות והמיקרו-סביבה של הגידול הקשורים לסוג אגרסיבי זה של סרטן הקיבה.
וציטוקרטין שונים. ידוע כי הם בעלי (CEA) מציגים מורפולוגיה אפיתלית ומאופיינים בביטוי של סמנים לסרטן קיבה, כולל אנטיגן קרצינו-עוברי SNU-16 תאי כדי SNU-16 הממלא תפקיד משמעותי בצמיחת תאים, הישרדותם וגרורות. חוקרים משתמשים בתאי MET, וביטוי יתר של קולטן c-MET הגברה של הגן SNU-16 וטיפולים מכוונים אחרים. בנוסף, תאי MET בסרטן הקיבה וכדי להעריך את היעילות של מעכבי MET לחקור את תפקידו של מסלול האיתות משמשים במחקרים על עמידות לתרופות, בבדיקות סקר בעלות תפוקה גבוהה ובבדיקות פרה-קליניות של חומרים כימותרפיים חדשים. הרלוונטיות של קו במחקר סרטן הקיבה מדגישה את חשיבותו בקידום ההבנה שלנו לגבי המחלה ובפיתוח אסטרטגיות טיפול יעילות יותר לחולי סרטן הקיבה התאים SNU-16.

Tissue	קיבה
Disease	אדנוקרצינומה
Metastatic site	מיימת

Synonyms

- SNU16
- NCI-SNU-16

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	אפיתל
Tumourigenic	כן, במדיום חצי מוצק

IDENTIFIERS

Citation

SNU-16 (מספר קטלוגי Cytion 305273)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0076

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Surface antigens

סוג דם A, Rh +, אנטיגן קרצינואמבריוני (CEA) ו-TAG 72

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Oncogenes

Myc +, erb-B2 +

Mutational profile

מוטציה: MSH6, p.Lys1358fs*2 (c.4065_4066insTTGA), מוטציה ;הטרוזיגוטי: TP53, p.Tyr205Phe (c.614A>T), הומוזיגוטי

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM גלוטמין יציב, w: 2.0 g/L NaHCO3 (מספר קטלוגי של Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

10% הוסף לתמיסה FBS, 25 mM HEPES

Subculturing

תאים בתמיסה: הסר את התאים מהמצע באמצעות פיפטה עם מדיום טרי. כדי להשיג תאים בודדים, העבר את התמיסה מספר פעמים דרך מחט בקוטר 22. והעבר אותה לצלוחיות חדשות

Fluid renewal	פעמיים בשבוע

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו- (מספר קטלוגי Cytion 800100), חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או CM-1 מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך C-שורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78° ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Donor age	33 שנים

Ethnicity	מזרח אסיה

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
הצהרת האחריות שלנו<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">

Material Transfer Agreement required	Yes

PRODUCT DETAILS

Composition table

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB