SNU-16

305273

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

SNU-16 ląstelių linija gauta iš suaugusio žmogaus prastai diferencijuotos skrandžio karcinomos. Ši ląstelių linija plačiai naudojama skrandžio vėžio tyrimams ir yra modelis, leidžiantis tirti molekulinius ir ląstelinius mechanizmus, susijusius su skrandžio adenokarcinomos vystymusi ir progresavimu. SNU-16 ląstelės ypač vertingos tiriant genetinius pokyčius, signalų perdavimo kelius ir naviko mikroaplinką, susijusią su šia agresyvia skrandžio vėžio forma.
SNU-16 ląstelės pasižymi epitelio morfologija ir joms būdinga skrandžio karcinomos žymenų, įskaitant karcinoembrioninį antigeną (CEA) ir įvairius citokeratinus, raiška. Jos pasižymi c-MET geno amplifikacija ir MET receptoriaus, kuris atlieka svarbų vaidmenį ląstelių augimui, išlikimui ir metastazavimui, pertekline ekspresija. Mokslininkai naudoja SNU-16 ląsteles, kad ištirtų MET signalinio kelio vaidmenį skrandžio vėžio atveju ir įvertintų MET inhibitorių bei kitų tikslinių gydymo būdų veiksmingumą. Be to, SNU-16 ląstelės naudojamos atsparumo vaistams tyrimams, didelio našumo atrankos tyrimams ir ikiklinikiniams naujų chemoterapinių medžiagų bandymams. SNU-16 ląstelių linijos reikšmė skrandžio vėžio tyrimams rodo jos svarbą gerinant šios ligos supratimą ir kuriant veiksmingesnes skrandžio vėžiu sergančių pacientų gydymo strategijas.

Audinys	Skrandis
Liga	Adenokarcinoma
Metastazių vieta	Ascitas

Sinonimai

- SNU16
- NCI-SNU-16

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žmogus
Seksas	Moteris
Augimo savybės	Pakaba
Biologinio saugumo lygis	1

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Epitelis
Tumorogeninis	Taip, pusiau kietoje terpėje

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

SNU-16 (Cytion katalogo numeris 305273)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	9606
Cellosaurus	CVCL_0076

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IŠRAIŠKA IR JAUTRUMAS

Paviršiaus antigenai

A kraujo grupė, Rh+, karcinoembrioninis antigenas (CEA) ir TAG 72

Onkogenai

Myc +, erb-B2 +

Mutacijų profilis

Mutacija: Lys1358fs*2 (c.4065_4066insTTGA), heterozigotinė; Mutacija: MSH6, p.Lys1358fs*2 (c.4065_4066insTTGA), heterozigotinė: TP53, p.Tyr205Phe (c.614A>T), homozigotinė

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

RPMI 1640, š: 2,0 mM stabilus glutaminas, š: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion gaminio numeris 820700a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % FBS, 25 mM HEPES

Subkultūrinis auginimas

Suspensijos ląstelės: Pašalinkite ląsteles iš substrato pipete su šviežia terpe. Norėdami gauti pavienes ląsteles, kelis kartus perkoškite suspensiją per 22 kalibro adatą ir išpilstykite į naujas kolbas.

Skysčių atnaujinimas	2 kartus per savaitę

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Donoro amžius	33 metai
Etninė priklausomybė	Rytų Azijos

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href=""/Kas mes esame/garantijos/" hreflang=""x-default"">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes

PRODUKTO APRAŠYMAS

Sudėties lentelė